


恒氏粹

天

道

一

A 00  
6483



恒民粹

天

中風

傷寒

瘟疫

斑痧

內傷

痰飲

咳嗽

喘哮

癰

霍亂

泄瀉

痢

中風

3110836

鸛燕水庫

所獲

夫中風之証蓋因先傷於內而後感於外之候也

但有標本輕重之不同耳

假如有病皆有因有証

因則為本  
証則為標

古人論中風者言其証之如岐伯大法四風証之類

三先生論中風者言其因之

謂開言心火甚腎水衰

知東垣言非外來風邪乃本氣自病

而主氣也

丹溪言西伯有真中風  
東南濕生痰之患然其氣

經曰邪之所聚其氣必虛是也

豈可以一中風之証岐為二途哉

治之法重乎外傷者先驅外邪而後補中氣  
外傷者先驅外邪而後補中氣



或以數風寒為君而以補損藥為臣使  
全在法量輕重而施治也

經曰有

取事而得者  
取精而得者  
取神而得者

又曰

緩則治其本  
急則治其標

急

若夫初病暴仆昏倒不省人更

者急以瓜丁藥

或痰涎壅盛而強不語高寸浮大而實

等症以通其勢

或人迎脈緊盛者急以小續命湯

或風氣大盛心火暴升而痰涎壅遏於經絡之中

此時也宜尋常索餅而已通達於上下故故本方

用附子以有斬關奪將之勢目以人參軍並行共十

二錢以追復其散失之元陽又用麻黃防風杏仁

桑葉開腠理以散生在表之風寒引當歸芍藥

川芎導入血分行血養血以滋養其虧損之真陰

或如石膏知母以降胃火或如茯苓以清肺金

看所扶見証以時月寒暑加減然病勢稍退精

神稍復輒當改用再漢法而以補氣補血清痰之

劑以調養其本氣而安

此急則治其標而本之治也

凡冬手足漸覺不隨

或臂膊及髀股指節麻痺不仁

或口眼喎斜語言蹇澀

或胃膈迷悶吐痰稠粘

或六脈弦滑而虛軟無力

或手足麻木及九半身不遂者

或手足麻木及九半身不遂者

或手足麻木及九半身不遂者

此緩則治也。本與夫本而標之治也。

腑者多着四肢故面加五色脉浮而恶风寒四肢拘

急不仁或中身之側皆早上膈其治多易

臟者多涕九竅故屢發失音耳聾鼻塞目

看二便秘皆胃中膈之真治多難

所為

先哲有言中

大法中

廣者三化等陽以通其氣

府君見者又不可以拘泥

或一氣之微乎

或下切之通利

又曰治頭心肝多肝則虛其價斯又不可不謹

或人外无六经之形影但手足不遂語言窒者此邪中於內无受病之阻痛

經之當得乎中而不可以標本論之是宜養血通氣

大秦元亮活愈凡之類信

脉法

寸口沈大而滑

記與相傳入英藏則五此為卒錄

不知人 身自汗出 為入 身自汗出

44

大法同通者音又曰信大救和應者在

丹溪曰中風大率主血虛有痰

或挾火与湿

諸書皆謂外中凡邪

清高作將息失與水不斷大極

然地有不同  
東南人皆覺濕土生瘧之生熱之生風之

真中凡邪者東垣云血脈中府中膈人說甚好

治法以治瘰為先補養次之

初中急摘人申全省

半身不遂多痰在左屬痰左氣虛三陳四君子亦隨姜可

肥人多濕少和附子行經

氣虛卒倒、參薤補之扶疾、瀘煎人參湯、加辛瀉、其

血虛以四物湯補之候疾生某俱姜炒

凡中風口開手散眼合遺尿不知人吐沫直視喉如鼾強

由脫筋痛身直攣頭上竅面赤和粧或頭面青

黑汗澀如珠皆為不治之証

動止筋痛是死血凝筋故痛而筋指不治

脉訣曰諸不治証見則不可治

合用方之指南

小續命湯東垣曰中風自汗者不可重灸其汗故此藥亦不

可極用之

麻一去毒 參去芦 苓 白芍 防己 桂枝 芎各七

防風去芦 附子重便煮 杏去皮尖 甘各七

要畧有石膏當用元附子防風防己

愚按石膏當因不可用而附子防風防己不可缺恐信寫之脫簡耳

右細切作一服加生姜五片煎溫服

凡中風木實六經之形証加減藥治之不可忘其邪之

內桂四即別 知母知母 知母中風邪宜先以知母續命湯証治

易老加減法

中風无汗惡寒 麻防風杏一依本方治一

中風有汗惡寒 桂一芍一杏一依本方治一

中風无汗身熱不惡寒 葛根一不四桂一依本方治一

中風无汗身涼 附子一依本方治一 附子一依本方治一

中風有汗身熱 桂附一依本方治一

中風六經混雜之於少陽厥陰或四肢不仁小續命公不加

卷四不難六

愚按先切製小續命以治中風初起无汗及手足痲痺閉節不利表實等証此藥則依標之藥之



望夜月如石青 冬 迎而奪陽明之氣  
 季夏之月如防己 木 冬 勝脾土之濕  
 初秋大暑之後加朴 苦 桂 迎而奪太陽之氣  
 霜降之後望冬之月加附子 辛 桂 迎而奪少陽之氣  
 此藥五時加微火法

更宜臨証審虛實與地之宜邪氣之多少可也

白丹 肺熱 養神 謂中風者為胃氣不流利此藥也  
 白芷 白檀 白防風 白木 白鬼 白知 白縮 白人  
 獨 白茯苓 白附子 白芍 白朮 白朮 白朮 白朮  
 芍藥 白朮 白朮 白朮 白朮 白朮 白朮 白朮  
 右細末煉蜜為丸臨臥嚼食風湯送下 上法肝氣  
 恩按此方為鞋揭走氣之味並無有冬不苓甘之補益而  
 寡固不可不驗象之  
 君用之於人 血虛 虛弱 精神 不足 宜當 宜當 宜當 宜當

二冬丹 治健忘 養精神 定志 和胃 外不心仲  
 丹參 一兩 丹砂 五兩 遠志 五兩 炙甘草 一兩  
 人參 五兩 菖蒲 五兩 炙甘草 一兩 炙甘草 一兩  
 右細末煉蜜為丸空心愈風湯送下  
 天防風湯 去風 順氣 治血壯筋  
 又治前後脚弱緩痛不能行履



右細切作一服每五片奉一枚煎空心溫服  
 治氣血兩虛挾風濕而成瘰癧不主行有之者多  
 觀治前後風耳聾 然 可以治不覺之瘰癧

丹溪活套

風痰盛喉如拽鋸者加薑星枳殼皂角防風指桑仁

血虛加犀角芍地有瘀血加桃仁紅花

氣虛加參朮黃自汗以黃芩為君少加茯苓佐以附子

風邪盛自汗身痛加防風羌活獨活

頭目眩利或頭痛如破加芎芷荆細

頂痛去芎加藜本或加獨活

无汗身痛脈浮緩有力或<sub>（傳寒）</sub>皆風寒在表之証加羌風

芎芷不尤之類

大便秘結不行四物三化微利之三五日一去可

中風氣弱利利之熱退自利

年老虛弱中風不可吐

氣虛卒倒不吐

肥人中風白喘手足麻木者加石脂屑屬痰用貝母仁南

半陳本連苓栢卷風刺蕤桂寸 即經者加附片

姜汁入酒行行太

瘦人中風偏陰虛火熱中物加牛膝苓栢

遺尿偏氣虛參苓大劑補之

右癱偏本酒栢酒連防風羌活芎甘<sub>（各半）</sub>半參朮面<sub>（各一）</sub>

麻黃三小附子三片

中風眼瞤斜語者不正則流涎或<sub>（半身不遂）</sub>老氣虛

酒色心火更扶外邪用參朮麻黃桂苓荆天麻面

星升葛芍石脂芍本細石青皂角加薑煎服矣

治治風寒得微汗而愈

或因寒而中宜姜附湯



# 傷寒

經曰人之傷於寒之則為病熱之甚甚不死若兩感於寒亦寒者則不免於死矣

蓋傷寒之証非若雜病之易知也

○惟漢張仲景深達是理者傷寒論一書載三百九十七法以爲法字之式

惜乎其言一處於平和之機外傳之愈久愈失其真者其法

亦方何嘗合之數且三陰寒証之用熱藥者十居七八

○而彼所謂傳經之傷寒自三陽而傳入於三陰之說但一於熱耳何由爲寒哉

是以不巳不使人之致疑之故後人紛紜之論俱未得其旨要

有至人傳曰傷寒大法有十四



○支 即病者多為專經 即病者多為傳經 蓋寒邪之中入者有定條

中於陽

但中於太陽者及胃熱而即發者尾只在本經而不傳裏者宜驅散表邪而愈

從太陽未及胃熱不從陽明少陽之而透入於三陰之經初不曾入於陽經而直傷於三陰之經而即病者

右同其未嘗胃熱是以一切為寒証要故多身霜降液至春分節發者是也

其元頭痛元大熱脈沉遲而微故古方又出中寒一證矣此証之宜宜四逆真武等溫中通脈而愈

若臨從太陽前抵心次而傳至於陽明少陽次少傳至於三陰之經者則為傳經之熱証明矣



自此以後病日以甚至十三日乃愈  
設或自春分後至夏至前發者是之

夫 春分國元即病者始之於經也

秋分至元即病者始之於經也

惟難寒邪之傳注經絡實無定傳故東垣曰

太陽者巨陽之為諸陽之首膀胱經病者湯者自入於本

名曰傳本

太陽傳陽明胃土名曰越經傳為發汗不微利小便餘邪不

盡透入少裡

太陽傳少陽膽木名曰越經傳為元氣病脈浮宜麻黃汗之

而不閉之

太陽傳少陰腎水名曰越經傳為表病急宜汗而及下所

以傳之

太陽傳太陰脾土名曰越經傳為受病脈緩有汗宜桂枝

而反至之脾脈痛四肢重

太陽傳厥陰肝木為三陰不至於有惟厥陰與腎脉流行自

太陽相標名曰越經傳金傳

傷寒論中

即病名曰傷寒

不即病者毒藏於肌膚至

春發為

此外有四時感冒新受風寒之証近有頭疼身痛惡寒



熱熱等處作感胃熱此非冬傷寒邪也時而發之重者

此之

傷寒之至并

肉體曰

春

秋

冬

傷於

暑

風

寒

濕

此四時之正病之

遍周肉體但有大經傷寒之傷寒而無三陰直傷即病

之寒証也

大抵

仲景以春三月及夏至前發者

為真傷寒未敢說其熱非

應是之

夫

春傷

風

皆冬受寒邪

皆冬受寒邪

皆冬受寒邪

皆冬受寒邪

皆冬受寒邪

皆冬受寒邪

皆冬受寒邪

皆冬受寒邪

皆冬受寒邪

皆冬受寒邪

皆冬受寒邪

皆冬受寒邪

皆冬受寒邪

皆冬受寒邪

皆冬受寒邪

皆冬受寒邪

皆冬受寒邪

今人因備仲景治傷寒法治之獲効遂通謂之四時傷寒實非仲景立法之本意之

目

目

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

不當汗而汗者

公并例治法

丹溪曰外感元陽傷者用仲景法

傷寒挾內傷者十居八九經曰邪之所湊其氣必虛

補中益氣之類，後六經見証，加減用之，氣虛者加。

附子以行參薑之氣。

東垣曰：內傷者，極多外傷者，間而少見之。

此蓋前人所未發。

有感冒輕病，不可便認，為傷寒。

用方指要

太陽經傷風，發熱自汗，鼻鳴乾嘔，桂枝湯之。至春初時。

春末及至前加芍藥，夏至後加知母或加升麻。

發汗過多，心悸欲按，去芍藥，加桂枝，身痛脈洪，加參。

胃脈沈寒，大便秘，服麻黃加羌活，芍藥，甘草，或甘草，半。

服桂枝後，形似瘧，日再發，或身痺，自汗，不出，得汗必。

解，加麻黃杏仁。

太陽証脈浮，頭及身痛，惡寒，數熱，无汗，而喘，麻黃湯之。

惟冬及春初，發病人，素有寒者，乃用正方。

夏至後，脈必數，斑黃狂，同。

傷寒中濕，身痛，身目俱黃，本方中，去桂，加連翹，赤小。

豆入藥。

即病少陰，經无表裡証，去桂，芍藥，加附子，得微汗，勿食。

風濕相搏，脈浮黃，痛去桂，加蔥，得微汗，愈。

煩躁，如狂，四。

有汗。

不得服。

桂枝。

若誤服，則其表不可勝。

數故，在此法，承犯三陽，禁食，解利，葛志，神效，名曰死，時，活。

卷。如陽明，即瘧，若主之，藥，或非无為主，也，乃機，故，及正之主。

故，大无不通，示无不入，因，前，痛，非，此，不，已，故。

風。一身，如，瘧，乃，軍，中，早，下，賊。

蒼不。一，聽，軍，令，而，行，所，使，引，之，而，至。

細。如有，確，壯，上，行，之，氣，色，陰，下，至，大，陰。

生地。使，邪，氣，不，納，傳，之，手，足，太，陰，脾。

正。此，是，少，陰，腎，治，頭，痛。

苓

治太陰脾熱在胃

寸

已極盡  
調和諸事

已上九味藥為一方然亦不可執一執中无權衡執二之  
當視其經絡前後左右之不同得其性之大小而治之

增損用之知神其功切而服

若經師無服以參湯投之  
後師溫服而不用湯投之

此藥不獨解利傷寒治雜病亦有神

中風行經者加附子

中風秘錄者加附子

東垣曰經云兩感於寒者死不治

一曰太陽傷寒  
少陰傷寒  
太陰傷寒  
少陰傷寒  
厥陰傷寒

太陽者府之自背而向人所共知  
少陰者府之自腹而向人所共知

鼻氣通於天故寒邪先入氣後鼻而入胃為水之府而經

故胃受之

兩感者府俱痛欬  
下之則有表裏既已二證故无矣

肝氣有虛寒  
肝氣有虛寒  
肝氣有虛寒  
肝氣有虛寒  
肝氣有虛寒

予嘗用天麻為佐湯同有生者十得二三

風者性已苓連二木寸寸知苦地各二

右細切作一服煎熱飲未解再服三四劑病愈則止

河間治書云  
傷寒傳三日在裏法當行之以散連連  
傷寒傳三日在裏法當行之以散連連  
傷寒傳三日在裏法當行之以散連連

若下之太早則表邪未盡入裡遂成  
虛者必危  
危者必危

虛者必危  
危者必危

虛者必危  
危者必危

甚表和解其表病勢或<sub>有汗發熱未愈當用小柴胡涼膈</sub>

若半在<sub>在表</sub>法當和解小柴胡涼膈主之

若裡熱微者當微下大柴胡解毒主之熱勢未退大柴胡合三一

三氣湯 大黃 芒硝 厚朴 枳實 各半斤 寸一不

右煎服

其病實胸或心陽脈緊盛者吐之

汗吐下三法之後元氣耗涼膈主之

病人熱已甚微熱未退者以益元散服之

甚病在裏脈沈細者元氣同凡寒暑淫

或表裡証俱不見

或由於諸邪所傷元氣心腹滿滿諸證悉除熱由虛

或發汗之後熱不解脈而浮者白虎加蒼不弄解之

或裡熱因虛陽厥極深皆因表下而成此証身冷脈微胃氣不

得以寒寒下之誤下即死

天下之後熱不逞再三下之熱愈盛者下之不足<sub>如微</sub>不<sub>如微</sub>

以法則元氣之理若輟而不下則邪熱極盛虛氣極衰脈

息漸絕必不可救如此之証是正氣未<sub>正氣未</sub>醫者到此<sub>一彈指間</sub>

傷寒下後<sub>汗出而解</sub>脈而浮白虎加蒼不弄解之

傷寒下後自汗虛熱不退白虎加蒼不<sub>入</sub>入<sub>入</sub>服知母止身涼

如此則下之後熱不退<sub>有汗</sub>至宜白虎加蒼不<sub>加</sub>

亦妙勿服常陽解毒調之

經者三下而熱不退者即死後人有<sub>四五次下而生</sub>者此偶然誤

中耳<sub>耳</sub>者<sub>得一二</sub>後學切不可以此為法但當前法用

解毒合涼膈調之

陽毒生斑涼膈加解

辨野熱盛在表燥而元汗溫熱在裡不宜發於外相持連處發寒  
茵陳湯合葛根湯下之

山茵 一兩 大黃 半兩 梔子 十枚 右細切煎溫服

汗下之後煩渴飲水清腸胃之

小便 不便 不通 五苓散 之更有外証加減用之

婦人証法皆然

孕婦三四月至七八月胎前產後其証月用之元氣

小兒減劑服之

此中有古人指傷寒不傳之妙後客宜慎定之

春三月及夏至前後溫熱微熱之証施之

舟車暈治法  
凡傷寒傳經之証初得太陽證惡寒發熱頭項強腰脊痛者計  
雖惡九味羌活湯表証之而愈諸痛悉除

亦不惡寒但發熱不解或微汗 暈 無出此為扶虛証宜用

補中益氣湯為主

有汗加桂芍

汗未透脈而浮緊加羌 蒼本防風倍升葛

痛問老蒼蒼參

仍頭痛未盡加羌蒼蒼刺細葛

湯加五味麥門天冬

○三四日間不更前藥、小柴胡證証如愈

寒熱腹痛少陽外証悉具只本方服之

並服補自利見太陽証証如少陽証未除者本方中加五苓

五苓不大便潮熱引飲本方中加芒硝加芍藥補太蒼老

加芒硝、或用河間三一養氣

七八日不經不解熱不退或 暈 仍以小柴胡看証

愈後同勞役依然者仍用補中益氣多服自安

虛回食復不可輕用硝黃之類正之蓋病後血虛大虛者依下之必死

傷寒下後諸證初起認入三五日後妄言不寐此神志不安慎勿

位下

脈多沈細是冷氣浸而主陽色白乾燥補中益氣倍加

升藥三十片

角外本弱得行下後大虛脈細數熱如火多氣促用參湯

甚有互法細數加升藥最用童便二三點而安

怯弱人感寒深致熱不食數日後不省人事言謬亂神思

昏迷面青齒黑入心必死之証脈沈細先用小量附子不食

急用官君子湯加附子煎以碗盛放水中少時絞其熱

性稍溫服之脈有神思即回然後可用別藥此理之險

証傷寒

### 戴氏活法

凡傷寒身壯疼痛惡風多過煩則喜發汗數必得大汗而愈

不同日然皆以六神通解散煎服如汗不透而脈高正而病解

如諸證神思不寧蓋熱邪已入裡不足解本方加參連斷

否

此法蓋極微和自為神妙不可易而忽之

傷寒發汗而未嘗曉諸麻黃而度按之有力或絕不見

用參生地各五錢附一錢大黃二錢半煎之不盡服五月

赤尾婦

### 虞搏之治例

東陽成十八歲四月得傷寒惡寒發大熱而渴舌上白胎

三日前身骨節痛

曾惟服頭痛而吧自利

六日身予診脈左右皆弦長而沈實且數

予曰此 本三陽合病  
今太陽已罷而少陽陽明仍在

小柴胡合解毒三服腹痛已遂皆除惟熱猶存  
九日後漸加氣熱痰聲如蟬蟬出大汗遂後而身復熱  
愈甚法當先清其面上有紅色赤淨而元氣漸復諸清  
亮間有諸清而赤者後涼膈散倍大寒三服自利清水  
痰氣亦不覺 大寒氣合解毒三服所下亦如前 予曰此  
蓋熱結成痼而燥屎未去耳 後以二方相同日三服  
得結糞如肥皂子大者十數枚痰氣漸平熱亦減至十五  
日熱退氣和而愈  
一知盤間傷寒論謂下後不可再下連日用此峻劑而獲  
安者何也 曰燥屎在下而腸面寒明者不可再下  
是故為醫者不可膠柱鼓瑟也

### 瘟疫

經曰蒼天之氣清淨則志意淑順之則陽氣固密有賊邪  
弗能害之

又曰冬不藏精者春必病瘟是也 多感於房事者人

俗名瘟疫醫書曰疫疔由疫毒而發而面黃目赤氣瘴氣

蓋指山嵐瘴氣疫毒瘟疫熱暑瘴氣而名之

一皆納胃四時不正之氣而為病也



本常曰

本常曰疫氣之發



視斯疾者其可不推運氣而治之乎  
仲景元治法

後人用微毒散治甚得理然亦有不能者

蓋痰氣有法治性如受病氣之深者愈智者而不足治

切不可作傷寒正治而大汗大下之

但當從乎中清而用陽明二經藥升麻葛根湯之看所中

陰陽絛脈証而以二方加減和治之

### 脈并

陽陽弱陰強緊更過溫氣表為瘟疫

二三日休熱脈滿頭痛食如故脈直而疾八日死

四五日頭痛脈滿而吐脈來如細如弦十二日死

八九日脈力不減自不妄言者要而不利脈來躁上按之不

### 瘟疫

脈數寸心下管下日死

### 合法

丹溪曰疫人病一般者此大行時疫之病有三法宜

汗不出者不至是者死  
厥汗汗自出脈浮數者生  
下利脈中痛甚者死

### 陶南史法

用三黃茶柏瓜木滑石香附人中黃麴糊為丸

氣虛者加黃下  
血虛者加芍下  
痰多者加陳下  
熱甚者加黃下

若病在少陽腹小柴胡加羌活微發寒

若病在陽明腹小柴胡升葛三方合服之

若太陽証便大便泄小柴胡加芍藥對五苓散元寒

若小便不利膀胱本病小柴胡加桂枝芍藥  
若大陰經元熱証用理中湯証以須腹痛而遲明日得止痛示



紫細之

若初看未端的先敗毒散治之看時在何經并隨經施治

若發熱小紫合桂枝五苓散連茯苓澤瀉湯

若瘟疫作渴小紫關加石一知一

若瘟疫發狂小紫合大柴胡湯大便燥結黃芩石膏湯

若瘟疫胃腸滿悶小紫加蘇陳連大便秘結大柴胡微利之

丹溪曰大頭瘡乃濕熱在高巖之上用皂及酒茶酒大黃隨病加散

東垣和靈痛少陽為邪出於耳前痛也治宜黃連上

然未除中寒後生必傷人今宜用續命

二黃湯治大頭天瘡黃芩同製連瓜散生可也

右細切煎服之

或云頭痛酒中便宜加也

身看者桂枝湯

身看者桂枝湯

泰和二年四月庚戌多疫病初憎寒壯熱休重以傳頭面腫  
盛目不能開上喘咽喉不利舌乾口燥倍曰大頭傷寒諸治  
終不愈

東垣曰身半已亡夫之氣邪熱毒於心脾之間主攻頭面

而為腫耳夫仙所製之方刻石以信永名

苓三錢同製連三錢同製參三錢陳去白甘三錢三不

白芍三錢升三錢紫五錢桔三錢板藍根三錢馬勃三錢鼠粘三錢

右為末用湯時七服之

或入大便秘結者用芒硝利之

人黃散治時疫病大頭天行

真紅岸置瓜露中煮連者佳水色細研一氣

甘三不辰砂雄黃粉一不半

右細末每服三不酒荷枯梗陽遂下

願領腫熱者用卷酒茶酒大黃

# 斑疹

肉桂曰少陰所至為斑疹

少陰所至者右火有余熱令大行戊子戊午歲火心火太過則制已所勝而燒燥肝金益肺主皮毛故紅點如蠶之狀見於皮膚之間

心火侮而乘之也右者曰斑疹

或傷寒溫熱病而發斑如綿者皆曰發斑

其証有陰陽毒是皆冬應寒而反溫人受不正之氣故至春

反而發為斑斑爛夫陰脈實大者名溫毒

或為傷外結熱極深者未焦黑變如烟煤狂言見黑而赤

而斑爛名陽毒

溫病下言太早熱氣未虛入胃

或下之太遲熱氣鬱積胃中

皆已成發斑之徵象也

或醫者誤用熱藥過多胃氣鬱結

及傷熱病虛火熾灼肺之間

者半生半死

治法用化斑湯即人參白朮湯升麻葛根湯之

痛加羌活附桂芍藥隨宜用之入上藥相合煎服

陽浮而數大瀉而表故陽脈浮數

陰實而太下其實惡欲陰脈實太

多沈伏

或細而數怕亡曰脈者血之波瀾故發斑者血數於肌膚故脈伏

或絕者冬月大溫人受不正之氣至春發斑如錦文脈伏者屬陽

## 法

丹溪曰發斑屬氣熱扶痰而作自裡而發于外通聖散中

加減

戴氏曰有血色而無顆粒者曰斑

屬裡者曰胃熱助平少陰太入乎太陰脾之故紅點如蠶生於

皮毛間耳白鬼濕心滯胃氣滯選用之

內傷發斑胃氣極虛一身之大透行於外所致宜補以內之  
 疹屬熱與痰在肺清肺火降痰或解散或行亦宜下者  
 戴氏曰疹小有點粒者是之隨和即沒而又起  
 丹疹皆是惡毒熱血蘊蓄於金口過者相二太合起即毒之  
 如遇疹以通和等藥下之則解矣  
 凡丹疹先從四肢起而後入腹者死



內傷

經曰

傷者氣也主外

故傷通裏

傷之則入

傷之則入

此內外陰陽廣府藏虛實之不固也

此內外陰陽廣府藏虛實之不固也

此內外陰陽廣府藏虛實之不固也

此內外陰陽廣府藏虛實之不固也

便作傷寒然陰用仲景汗下解利之法多死張氏嘆哉  
 我東垣個生靈之大狂者內外傷并脾胃弱等二皆扶植  
 胃氣為本誠萬世不刊之妙典也蓋補中益氣等湯為主  
 治之若已破者其法如行之以元有不破者平今醫不識  
 意向有錯其甚者必明不偏於此則偏於彼

或遇清氣脾胃下下

候源以補中益氣等藥一試則

候源以補中益氣等藥一試則

証之決意改用汗下解利之法

不之悔故王莽乃有肉傷不足中上有金之議此發東垣之所余發者耳夢者宜潛心究察甚虛實似是之非庶不笑人之天年也


《史外傳》云：寒者有衣之，証甚數，熱者多之。熱傳作甚，熱之拂之，發熱數於皮毛之上，如拂毛之拂明，甚熱在裏者，甚曰臭，臭氣塞不通，心中煩悶，死者甚多。凡孝子之猶似裸體，便不覺禁，甚重衣厚事，逼近，烈太終，不覺寒甚矣。一日時增加，愈甚，必待邪傳入裏，乃已。蘇子重獨前收後者，多后有力，脈中和，口和，穀味三便，此常態，骨疼痛者，已動搖，手背熱，手心不熱，是皆外感有金之權之。

上燥熱發於肌肉之間，拍之，摩手明。其熱在陽之甚，口鼻中氣短，少氣不足，以息言者，風寒之邪露地中，遇大風，風起，邪乃不覺，惟門窓隙中，此少賊風，則大寒之氣，未必待甚。

陰陽既乖汗書則已語言困倦前重後輕氣不相續脈  
中不和口不知穀味大小便或不通或心下痞悶或胃中切刺  
之痛手心熱手足背不熱是皆內傷不足之候之  
以此并下之宜不知也黑白易見者 有寒中不足也

以此昇之豈不謂之白之見乎

又當參考其脈理求其  
不區中之有金  
外感扶因傷  
之異



右關脾脈大而數

大於他

右關胃脈損弱甚則隱而不見但肉顯脾脈之大數

微緩時一代

右關脈沈而滑

宿食不消

合注例

脾虛口

世之病內傷者為多但有所扶外邪者

扶外邪者

時常以補元氣

看所扶而為用藥

氣虛甚者少加所扶之行氣

載氏曰凡內外虛証

扶虛者補中益氣為平

或曰傷而外感物為內傷扶外感証

治法

先補中益氣

合用方之指南

補中益氣湯

黃一不

陳

升人

本

右細切煎服

脾胃一虛脾氣先絕故用黃芪以益皮而固脾理不令

自汗

且喘氣短損其元氣用參以補之

心火乘脾用炙甘草以溫之

脾胃急痛腹中急痛者宜多用之

此三味除濕熱煩熱之聖藥

白朮苦甘溫除胃中惡利腰膝同細

升柴苦平味之薄者升胃中之清氣又引薑升甘溫之

氣味上升已補傷氣之散解而實其表又緩帶脈之

縮急

用當歸以和血脈

補以理胃中之氣又已助陽氣上升以散傷氣助諸甘平

或必加黃柏以散腎水而溫陰中之伏火

表熱者一二服氣和微汗而愈



双和散補血養氣治虛勞少力不熱不寒溫而有神

白芍一斤 莖熟地 芍湯 芎芎 肉桂各四

右細切作一服入姜枣煎溫服大病後虛弱之者以此調治

東陽盧廣文善推明丹溪之醫學老之年四十時西月自往

永康路跋涉勞倦發熱身倦頭痛頭不痛

自以為外感少用九味羌活湯三服汗出熱退

前後又服小柴五六貼熱愈甚

經八日召予至前謂前是煎成湯飲一盞在案問之乃大

氣喘喘欲飲

診其脈右三部浮洪略弦左三部 予曰此乃熱氣

此因傷風感熱比其大下必足

伊曰我平生元氣頗虛素元虛損延明是外感元氣

予曰我作陽明內實指中土之氣 脈既小滿 而又陽明內實指中土之氣

今經八日不應仍在意欲飲作何經而延治之乎

伊則唯不語

以補中益氣湯為附子三小作大劑至是夜速進二服夫

明性診脈畧平和

伊言尚未服仍謂前某元氣助發易外感退熱之藥

予曰再飲前某二服不覺當罪於又知前二服能託便減半

伊始曰我知誤矣

去附子再煎二服至得熱退氣和而愈

予則告退甚熱無退休獨困倦

伊如前自安二十余貼脈後方得強健後元而甚

痰飲

經曰諸氣膈脅皆屬肝金蓋肝氣鬱則感寒盛則生痰

丹溪曰自然成積自積成痰也按痰者水逆成窠此為居

左痛為噎膈及胃之次也

王隱石曰痰証古今未詳方者蓋有諸飲之異而莫知其為

痛之源

頭風目昏眩運耳鳴

口眼喎斜肩膝耳輪痠痛

四肢遊風腫硬似痛非痛

齒頰痠痛牙床浮腫多痛痒不

啞舌吞酸嘔噎

咽嗝不利咯之不出噎之不下色如煤焰

心下如停水雷心頭冷痛時作

多寐奇怪鬼魅之狀

足腕痠軟腰背卒痛

四肢骨節痠痛或並走常乃至手麻臂痛或若挂風

脊中脊脊一脊如冰凍之寒痛

半身不遂如出得

腰膝痠痛口麻舌燥為喉因等症

胃脘間如自氣文結噎塞煩悶有和煙氣上衝頭面烘熱

為失志顛狂

為癰瘡

或

為勞瘵痿痹之疾

為風痺及脚氣之候

心下怔忡驚悸如與人搏指

吐冷涎清水黑汁

甚為脾癰腸毒便膿車駁

其為內外疾非止百端皆痰之所致

蓋津液既凝為痰痰而濁湧上焦故以乾咽乾

流而之下則大便閉塞而如枯骨毛發焦乾

婦人則經閉不通

小兒則驚風搐搦

治法宜先逐痰痰然後看虛實調理

痰疾尤為通淋三焦痰飲之要藥

惡痛心其論証圖詳不獨虛實而以一噴痰攻之證未中乎

肯綮

蓋痰重者有痰痰重者有痰



丹溪曰諸痰用利藥過多致得氣虛則痰反易生而多矣  
又曰中焦有食積生痰而生病者胃氣亦賴所養辛不可使  
致之盡則愈虛而病劇

支痰痰凡<sub>山可搜入於形氣壯實痰積膠固為病者</sub>  
<sub>在氣虛體弱之人決不可輕用之慎之</sub>

肝脈并<sub>肝脈者</sub> 肝飲不旺但苦喘粗氣

肝飲不旺但苦喘粗氣  
肝脈如滑者傷飲

肝脈數有寒飲者玄難治

肝脈沉者懸飲內痛

其人短氣心腹脹而走痛脈沉者有面飲

或之兩手關前脈浮弦大而實者痛上有稠痰宜吐之而愈  
病人百葉玉筋關脈伏而大者痰之咽胞及喉下如炭煙黃

為者亦痰

丹溪曰久得諸脈痰飲膠固脈之阻滯之卒難治固要費調理  
畢批曰飲脈皆強微沈滑

合諸例

熱痰用黃芩連瓜葉子如青茶亦好  
痰多飲少用三不又用茶附子及貝母

酒一兩瓜葉青茶

食積一兩神曲麥芽化痰消積

瓜痰用面芩和附子

寒痰用半夏

尤痰用海石雷附子及瓜葉子

服下痰白芥子不忌連

四肢非介連不行

腸胃通可下而愈

咽喉結喉而不忌者華海石枯龍牙佐以朴硝薑汁蜜丸喻化

痰之為物隨氣升降故无起不到

麻路當吐痰在膈上必用吐膠固稠濁必用吐痰在脘中一非

吐不可吐中就有發散之義

凡吐法宜先外投之氣用芎瓜梗橘茶芽生薑之類先以二布  
勒腰腹而於无風處探吐蘿蔔子半升調和漿水一碗去

租入少油多蜜過服少時以匙銅探吐

和寒濕瘧已衝陽倒壁

寒本同瘧微其下之

夫也移大巨脘上腸熱瘧

瘧疾

瘧疾

瘧疾

瘧疾

瘧疾

瘧疾

瘧疾

瘧疾

瘧疾

瘧疾

瘧疾

瘧疾

瘧疾

瘧疾

瘧疾

瘧疾

瘧疾

瘧疾

瘧疾

瘧疾

瘧疾

瘧疾

瘧疾

瘧疾

瘧疾

瘧疾

瘧疾

瘧疾

瘧疾

瘧疾

瘧疾

瘧疾

# 咳嗽

由肺而起者皆合久咳非肺之皮毛者肺之合之皮毛先受邪氣之入其合之五臟之氣久乃移於六府

何因只中謂之有痰而有肺氣傷多不消也生痰者其味非此格寸

咳嗽謂有痰而有聲蓋目傷于肺氣動于脾運咳而為嗽也木半五味防風

大指素秋之氣宜清肅也動之氣必上衝而為咳甚則動

于脾運食而為痰也

又其陰皆令久咳惟濕病痰飲入胃而之而不行上入于肺則為咳嗽

假令淫在



故咳嗽而元痰者以辛甘潤于肺

又欲治咳嗽者當以治痰為先治痰者必以順氣為主是以

百里半支腸主痰而咳嗽自愈

枳殼橘紅利氣而痰飲自降

痰盛而食食者小痰氣微下之

冬月嗽而痰者有謂之熱嗽小兒者如金

## 金肺

此治法之大要也


因脈微為咳肺脈微急為咳而喘

肺緊為肺寒咳嗽者寒傷肺為飲

肺浮而緩者傷風肺如弦滑

脈沉數為實熱脈弦為水

洪滑多痰



# 咳嗽

內傷因受風六府皆合久咳非肺之皮毛者肺之合之皮毛先受邪氣也其後其合之五臟之氣久乃移於六府

何問只謂元氣而有肝氣傷而不清也生要言五味外此核寸

咳嗽謂有痰而有聲多因傷于肝五動于脾濕咳而為嗽也亦平五味防風

大指素秋之氣宜清肅而動之氣必上衝而為咳甚則動于脾濕咳而為痰也又吳陸皆令久咳惟濕病痰飲入胃而之而不行上入于肺則為咳嗽

假令濕在



謂之風痰為患不固宜隨証而治之是

故欬而无痰者以手甘潤于肺

夫欬諸咳嗽者當以肺病為先治痰者必以肺氣為主是以

自里平五臟之痰而咳嗽自除

枳殼橘紅利之氣而痰飲自降

痰盛而食不食者小量五散下之

月嗽多痰者有謂之熱咳小量明和石青如女此治法之大要也

肺并

因脈微為咳肺脈微急為咳而唾與肺脈微急者為虛寒

脈浮而微者為虛小脈細者為虛

脈沈數為實熱脈沈為水

洪滑多痰得直者生

欬而脈

浮滑者生  
弦者死  
沉小伏匿死  
堅大如蠟癰死  
小堅急脈形數熱死

諸例

丹溪曰咳嗽

凡肌瘦脫形熱不咳也肺虛且泄肺虛者皆元証

凡寒者平發散行痰之証如麻杏桔、類要參和也

凡寒者肺熱下肝夜嗽者三拗如母肺大而停氣熱加平生

寒生薑切為片肺乾為末元如芥子太寒心清米飲

大主降火清金化痰平薑蜜桔半青杏附海石

訶子蜜丸嗽化存肺痰如面如星

喘嗽遇寒則發此寒包熱之証喜熱自陳酸桔麻瓜陳薇

通茶甘如酸寒去茶加香

乾咳者薑條大附之甚難治乃痰鬱火邪在肺呼不用掃

搜以開之下用補降降者不已則虛勞復行倒倉法此

証和得志者有之

有痰目文逆上者必先治火

然亦有痰火熱急者痰急先降痰而後降火之

勞嗽者逆汗如熱痰多作寒熱是主補降清金如物加芥

淫姜汁

陰虛火動而嗽中痰含二陳順而下之加炒柏知母如佳

陰虛咳嗽或吐紅者中痰加知柏參麥五味桑白地骨

肺虛甚者人參膏以生薑法依之有痰加痰葉此好色

腎虛者有之

咳嗽聲嘶者乃血虛受熱用青黛蛤粉蜜潤服之

痰嗽者玉容痰嗽使有痰用半薑仁貝桔知母

石末姜汁浸蒸餅丸服

痰多喘嗽木半香附一茶五石末姜汁麴糊丸服

痰嗽因酒傷肺用青黛瓜蒂蜜丸喻化以救肺

嗽而有痰冬肝命元火熱肺氣

食積痰嗽主補加二母和連柏炒為末丸如椒太藕汁吞之

肺脹者主叔欬動則喘滿起即愈者是

肝因火移移遂成鬱鬱服滿用訶子為君佐以海粉香附

青黛杏仁類

春是春升之氣

九嗽

秋是秋降之氣  
冬是冬寒外來

用藥發散之後必以半夏等逆降  
不再作

早晨

上午

午後

嗽多者

此胃有食積至此時大氣流入肺中

胃中有食積

胃中有食積如母不和胃降不

大氣降下肺元氣用藥則以五味五倍飲而降之

胃中有食積如母不和胃降不

大氣降下肺元氣用藥則以五味五倍飲而降之

嗽而服痛宜以青皮陳肝煎後以二陳湯加芫花附青黛  
姜汁一茶匙者白芥子之類

寒熱交作而痰嗽者小柴胡加知母一兩加白芍五倍桑白

治嗽最要分肺虛肺熱

肺虛久嗽

肺虛久嗽宜

肺虛久嗽宜

東垣曰治嗽必用如喘者為君然有外邪者豫厚之惡肺傷邪氣寬  
發散之而後用之可也

肺咳喘咳者用久寒  
凡寒邪盛者用人參

丹溪嗽須分氣虛氣實

久嗽已發熱

肺虛久嗽

肺虛久嗽

肺虛久嗽

喘咳

經曰諸逆衝上皆屬於火

又曰夫起居如故而息有患者此肺之絡脈逆之

何因曰火氣甚為炎熱甚為冬寒

故為寒則氣逆而息

故為寒則氣逆而息

是以

寒則氣逆而息

寒則氣逆而息

寒則氣逆而息

大抵

喘促喉中如水雞聲者

喘促喉中如水雞聲者

喘促喉中如水雞聲者

喘促喉中如水雞聲者

無熱者有不曲痰火與鬱火寒外束而致之者之

外有（陰虛發喘氣從肺下起直衝清冷而上者）

是故細喘之先証（有案）治法天開之隔者

看（指不足）者鑿殺之耳

### △脉法

喘急脉

滑而浮者主  
瀉而數者主  
宜急瀉

不宜急瀉

脉數有熱喘咳吐氣上不得卧者

上氣而停脘有息脈停大不

上氣躁而喘者為肺脹故為風水發汗則愈

### △証治例

丹溪曰喘急者氣為之所鬱而鬱痰在肺胃者

痰者（陰虛）為主  
大寒者（陽虛）為主  
陰虛自小便下大難起  
而上逆者而喘者參商補之

### 戴氏曰

痰者九喘便有痰色

大寒者下虛下虛得食則煩食已則喘

大醫胃中而實大腸上有稠痰得食腹下主痰喘則難止

精久食已公胃反助主痰痰再外上喘以大作俗云如此作

胃虛以燥熱之藥火傷太

氣短喘急者呼吸急促而元氣虛

又有胃虛喘者懷府指肚喘而面赤者是

凡人喘

和氣喘以救正氣

為主

大急甚者不可用苦寒寒大盛故宜溫却之切禁煎椒甘五

七之研為極細末生薑湯酒服喘止之後因（痰）

喘頭分虛寒

久病發喘必是肺虛肺虛者以肺

新病肺實而發喘宜辛白辛力麻者

和知孰是

東垣曰

久嗽肺熱在肺不用人參

新病未成前熱者用人參

祖傳經驗方用苧麻根和砂糖燉煮時時嚼嚥下永絕病

根神効

又方用猫兒頭骨燒灰酒調二三小服使吐

癰

經曰

及傷於暑秋為痲癰  
先寒而後熱者為寒癰  
但熱而不寒者為溫癰

二日一作

經綿綿不盡古方多用峻劑恐非東坡所居為所害  
殆悟常山烏梅砒丹初劑誤投之於病重者必危

三日一作者邪入於三陽經

子午卯酉  
辰戌丑未  
日者厥陰癰  
少陰  
太陰

寒熱吐衄舌乾口渴三陽為病皆燥而連然

應寒食熱腹痛引腹如餅善噦三陽為病皆

寒熱吐衄不食腹滿自利三陽為病二不索者

癰得於暑當以汗解或曰取涼太以汗解成癰其初感也

弱者即癒

胃氣強者伏而動至於再感後則肉傷甚痛乃作宜其

難養

之感暑者亦寄於邪之故邪汗多不解

今之通此疾者已終年三却或胃氣重傷而飲食欲指此症

必先求本等補劑為害如柴葛等藥散其邪而反得汗而

虛又行補養其下休屬陰虛難得汗

補其力到汗亦至足方佳非

又病極深邪氣必自房傷以至肺其氣無時若發午後更前

者血虛病為難愈須繼早亦佳非也

治新疾者

大忌飽食過數日食飽病愈加重

尤當以汗之難為難重之

別有陰虛証每日午後惡寒發熱者晚亦以微汗而解

趙子思曰  
此症之



脉必虚濡而数

且

虛癆  
腰膝  
不強

為耳若誤作癰治而用此常然

三不校

醫宜以脉証參驗其虛實而療之每級巨脈以緩久之

脉法

癰脉自弦

莊嚴寺藏經  
強而小緊下之

脉經云：凡脉自下上。

微則為康  
代最則死

信本可証

1

+

虛者必用參朮一二貼托住其氣不使下陷位用他藥

若命

要與洋人競爭，為主導人。

數發之後便宜截而除之久發則得沖氣虛弱病邪已深而

建信託丹等截葉不怪用

大鍋大熱用小火胡

加知門連指振莖

瘦渴用生地黃門天花牛膝知母黃柏干葛生白芍

大鹿三陳加川芎紫萸二木一補一發某之

痰涎胃屬熱多寒少夫便燥寒大柴胡剋之愈

久施不以行三陳。倍加二木少加。其即

兜廔有瘡塊者生地芍橘芍炒苓半片生薑煎頭胎灸驚

第一、

癰疽疔毒等症。用此藥水塗患處。即能消腫止痛。化腐生肌。其效如神。

和神起表芽隨和於鴉座所離漫送下

某山出易分而散芳澤口木正而月煎露一宿鑒之

六經之弁証

太陽証腰痛

雞已老作如生此羹湯小茶胡加桂湯

必明証先寒洒漸寒甚久乃熱去行

枝二白虎一湯羹苓芍藥加桂湯。

陽証身體解慄寒不甚熱不安

多汗、葉小紫胡

1000

太陰証系系給太息不嗜食多寒熱汗不痛至則善吐已乃  
表小建中湯異攻散

少陰証胸吐吐熱多寒少欲閉戶牖多其病難已小柴胡  
加半夏湯

厥陰証腰痛小腹滿屈伸如瘰癧氣不忌腹中怏怏而物食  
胡杏歸附子湯

大抵瘧屬三入陽實作心煩苦常栗振  
予壯年之癘初病身有二男皆年四十余皆得瘧癘三年復

發於寅中已亥月  
一人登歲於巳卯退於申丑人登歲於亥退於寅子卯復到

初可買藥保身  
查余乃陰中之陽病宜補氣助陽小柴胡湯加參苓白朮不月陳青馬

夜發乃陰中之陰病宜補血助肝小柴胡加四物加青皮

各五十貼如美更效於未發前二時服每日一貼服至八  
點間日得大汗而愈永不再發

# 霍亂

丹溪曰吐瀉并發  
外致此先哲確論  
切勿多食食米湯一啜下咽立見安靖吐瀉止之日兼飢甚方

可多稀粥少食以漸而將息  
元振曰霍亂心腹卒痛嘔吐下利憎寒壯熱頭痛眩暈小

先心痛則先吐  
先腹痛則先利  
甚則將助入腹即死蓋陰陽反戾清

濁相干陽氣暴升陰氣外墜陰陽各隔上下爭趨  
仲景曰邪有上下則吐瀉此為急病

然吐瀉為急下死其一  
霍亂吐瀉者此名乾霍亂多急治名痼疾腸

沙宜吐以提其氣最良

吐瀉者急下死其一

法曰既有其入必有其所出今有甚入而不通者必有甚塞之故轉  
筋吐瀉者甚氣有三

諸法宜分利陰陽

一曰風大極霍亂吐瀉之症皆風木濕熱之  
二曰風大極霍亂吐瀉之症皆風木濕熱之  
三曰風大極霍亂吐瀉之症皆風木濕熱之

仲景曰熱多欲飲水五苓散  
寒多欲飲水理中丸

合脈法

微而洪代命散、隱而伏、大而虛、結促代皆不可斷心系  
微弱漸近者死、氣口弦陽脈向在宿食而欲瀉陽理吐也

合治例

舟渡日生美理中湯最好

一方

將筋屬血熱品板加酒茶紅芍蒼木苗星鹿膠

轉筋

乾霍亂死在頃刻

暴泄如取周力汗冬冷脉弱不食甚吐不止

可食桂枝湯

霍亂已愈而胃中尚有睡氣者以溫填滿脾孔多之對壯熱

又灸天樞氣滯中脘

九霍亂

凡霍亂

冬月

泄瀉

經曰

又曰

叔和曰：濕多成五泄，是故知風寒濕熱皆能令人泄。泄，通也。手足

大抵浮利小便

清白不燥為要

完穀不化，是胃虛也。利，是脾虛也。水泄，是脾虛也。微清，是胃清也。不化，是身冷不渴，麻痺細微者，皆寒証也。

又大便秘，九穀因消化而化，及化泄便新者，熱也。寒泄，多穀消化，看未化者，有之。

△脈法

經曰

脈細，飲食不化，泄利前發，飲食不化。

是為五虛，死。其穀閉，人胃泄注，則虛者活。

脈桂，同泄，食不化，不得留，下腹無脈。

微小，微連者生。

脈訣：下利，微小，則為生脈。

大抵脈者，是生脈。

△治例

丹溪曰

有本，有標，有食積，有濕。

戴氏曰

飲食不化，泄利，是胃虛也。水泄，是脾虛也。微清，是胃清也。不化，是身冷不渴，麻痺細微者，皆寒証也。

脾胃不和泄，有胃苓湯。

五苓散。

俗例：用法某條，若相得者，是也。若不相得者，是也。

痛泄要方：本方，白芍，二錢，陳皮，一錢，防風，一錢。

右對煎服，或丸，用久，加升麻六分。

本芍湯，治太陰脾經受濕，水泄注下，伴重，微滿，困弱，無力，不食，水穀不化，本方，白芍，二錢，甘草，二錢。

右對煎服。

一方：治食積，濕熱，非此，若本方，白芍，二錢，本方，一錢，桂枝，一錢。

右對煎服。

一方能維他身熱脈痛微汗 防風 芍 苓 各二

母護法金

右刺腹室心腹

久世數年不食或既死元氣下陷及大腸不行候命而然用木  
弓通橋通刺五條為務 為先急者下後凡并身道下  
如浮水脈不痛屬氣虛而若下後加若外柴防傷不補以  
提之而食  
一人吐瀉三日若先瀉後下後多矣天把氣海三穴立止也思聖

刺

桂曰後後而便腹與知氣行血止也 便後而便腹血者急而用  
血行而血止者急而用也 也故

何問曰

和氣則傷血即腹  
作血則便腹即急

芍藥湯佳也

後重則宜下  
腹滿則宜和  
身重則宜和  
脈強則宜和

何問曰

腹血稠粘心重者  
身冷自汗心熱者  
凡邪外未宜行  
身熱者宜用宜和  
身表熱者宜和  
小便法者宜利之

又曰

去者送之其法去過其未  
二者止 其法去過其未  
其法去過其未

古方以浸疝法同諸藥朱紫微瀉殊不知

丹溪曰先

水浮 水沉 水浮 水沉

者此 胃弱脾微神衰

是皆先切

脈法

脈結去腸下腹脈

沈小流連者生  
洪大數身熱者危

又曰腸澼弱東脈

小細者生  
洪大者危

奔伯例

丹溪曰利

白濁 血 自 小腸

大腸 寒

前為濕熱蒸於腸胃脾胃而成其病皆熱証之信也利白為

寒熱証

下迫者痛小便赤澀而利白者必多有濕熱明矣

故治利者必用寒以勝熱

用寒以勝熱 微加辛熱佐之為養數開通之用如固 無不效

仲景治利亦下者悉用寒氣辛溫和緩下

大黃之寒其性善寒 治利者下之通其行傳氣 緩以甘平之甘

以陽通瀉腸胃滋潤輕快積行即止

高男例

用寒藥為主 裏急後重經所濕下迫者皆屬火熱所為加 法熱之劑必緩而何

初得一二日間元氣未虛必推瀉之

大寒氣 調胃承氣 下後有氣血調

理氣 參不 血而物

立見後不可下

此亦大寒言也氣血

虛者一二日亦可下 矣者十餘日後亦不可下之而為者

腹痛

白芍 芍中為君 神木為佐

寒 如桂 熱 如枳

初下利腹痛者用溫藥姜桂之屬切忌用藥則熱和緩氣

虛則起 留不可用

後重者積氣墜下之故用枳實滑石湯和氣木香枳實

身熱按外感初起與用小柴胡湯

最熱惡寒身有微痛表証宜微汗不當汗可生薑蔥服

方治痢扶亦感多効

發熱不止為陰虛用寒涼藥必更

溫藥 外毒

大孔瘻同熱積於下之木香枳實湯連加妙手

仲景治孔瘻 二便不通 久病身冷自汗脉沉小宜溫之 暴病身熱脉洪大宜清之

下血者宜涼血治血本統之類或用朴硝

有瓜蒂下膿宜升提之蓋瓜蒂傷肝主血故之

有溫復宜行經流熱

血利久不愈者屬陰虛四物為主

古方用厚朴為行氣導滯之氣得氣稍行則止

枳殼多少錢亦不宜久服

只以陳皮和茶可也

古方多用粟殼治嗽至痢症要先生病根乃收功後若

力保氣少要食此枳殼託宜用木厚身厚者加參陳補之

虛而痢即止

久痢休慮氣弱清世不生亦當止談之訶子肉豆蔻白朮半

牡蠣之類投而用之

肺病者宜用

然頭以陳皮為佐應太陰亦已作瘕甚者多天枳殼海

痢後糟粕未盡或食粥稍多或飢寒方食腹中作瘕木陳二

味煎湯和之自安

如痢已減十之七八機積已足糟粕未盡用炒芍藥芍藥陳苓

煎湯下固腸九三三起此九性燥能去積去濕之功

若滑氣未盡除者亦可應用

如痢後脚弱細細小用木三兩白芍藥板各三兩半枳五兩和

飯九之品物湯入陳甘煎湯送下

噤口痢胃口熱甚故用連參煎湯終日呷之如吐則再強

飲但得一呷下咽便好

又用田螺搗食肝中引下其熱

人不知此為用酒非以酒為引下其熱也

木飲細下一條七匙動

兒痢用連參大黃甘中煎服

此血者

凡下痢

如屋漏水者

大孔細如針筒者

一方連參大黃連參枳殼白芍藥甘木滑等分丸白湯下

芍藥湯

右細切煎空心服

初病後重者連服  
知 瘡滿氣不宜通  
加 芒硝倍大者  
枳實  
黃柏

大便後下血脈中

不瘡者連服  
瘡者連服  
連服  
連服

益元散謂之為治痢之聖藥其功不盡述自清石 粉甘中一白

右細末每服三不白水調服

丹溪活套

痢疾乃外感風濕內傷之候分表裡治之

在表者 惡寒發熱身重便痛宜小柴胡湯參苓白朮湯芍藥湯

餘邪未盡更宜芍藥湯以微其邪極積已盡而更在表者大腸

不行收令散之宜止瀉也

凡痢不同轉多邪氣正盛而果微之難止過之愈不克未成

休息痢三三年不愈也

△活例

一子年五十五秋間得痢疾月余服藥而少愈極積已暮冬

糟粕不盡晝夜五六次入廁脫肛又半月諸藥不効

他醫一子如法仿造多用生薑米積作羹入沙糖

一小匙不用溫酒煎熟煮吃一二碗三日不愈大腸自

既實其肛門亦收而不脫


乃驚介忠屬金而有土性溫能補脾肺


為平補脾金

糖甘補脾金

肝氣既定大  
腸亦隨而安  
得以行收合之  
功補脾者虛則  
補其母之謂也








恒民粹

中庸

道三自筆

二

A 00  
6483



A00  
6483  
中庸之注

鬼神

以二氣言則鬼者陰之靈入神者陽之靈也

以一氣言則至而伸者為神及而歸者為鬼其安一物也

鬼者陰之靈入神者陽之靈也

鬼者陰之靈入神者陽之靈也

鬼者陰之靈入神者陽之靈也

嘔吐

噎膈

積聚

虛損

勞極

眩運

腫脹

心痛

腹痛

腰痛

膝痛

頭痛

疝氣

脚氣

痛風

痿証

諸氣

麻木

耳病

眼目

口舌

諸虫

齒

鼻

血証

痔漏

喉痺

瘡

癩

癰

邪崇

汗証

驚悸

健忘

癰

邪崇

怔忡

驚悸

健忘

癰

邪崇

鸚鵡

鸚鵡

嘔吐

經曰諸嘔吐酸皆屬於火  
東垣曰支呃吐噦三者俱屬於胃者提司心以其氣  
血多少為異耳

吐者  
陽明多血多氣  
太陽多血少氣  
少陽多氣少血  
噦者  
有物無病血俱病也  
有物無病血俱病也  
有物無病血俱病也  
有物無病血俱病也

吐証有三  
上焦在胃口上通於天氣主納而不納故上焦吐者皆從於氣  
其脉浮而洪其証食已即吐渴飲飲水大便結上氣衝胃而  
發痛其治當降氣和中

中焦在中脘上通天氣下通地氣主腐熟水穀故中焦吐者皆從於積  
食多氣相假為積而痛其脉浮而長其証或先痛而後吐  
後當以毒藥去其積換柳木香行其氣

下焦在臍下下通地氣主出而不納故下焦吐者皆從於寒其  
脉沈而遲其証朝食暮吐暮食朝吐小便清利大便秘而不

嘔吐

經曰諸嘔吐酸皆屬於火  
東垣曰丈嘔吐酸三者俱屬於胃者振司以其証  
血多少為異耳

吐者  
陽明多血多氣  
太陽多血少氣  
少陽多氣少血  
故有聲有物無病  
有聲無物無病  
有物無聲無病  
有聲無物無病  
也

吐証有三  
上焦在胃口上通於天氣主納而不納故上焦吐者皆從於氣  
其脈浮而洪其証食已即吐渴飲飲水大便結上氣衝胃而  
發痛其治當降氣和中

中焦在中脘上通天氣下通地氣主腐熟水穀故中焦吐者皆從於積  
食多氣相假為積而痛其脈浮而長其証或先痛而後吐  
後當以毒藥去其積枳實芍藥湯行其氣

下焦在臍下下通地氣主出而不納故下焦吐者皆從於寒其  
脈沈而遲其証朝食暮吐暮食朝吐小便清利大便秘而不

通治法當以毒藥通其秘塞溫其寒氣大便漸通復以中焦藥和之亦令大便秘結而自愈之

此外有傷寒陽明實熱甚而吐逆者

有內傷飲食與塞太陰以致胃氣不得宣通而吐者

有胃熱而吐者

有胃寒而吐者

有久病氣虛胃氣衰甚聞穀氣則嘔者

有脾濕太甚不能運化精微致清痰留飲膏滯上中二焦

時惡心吐清水者

### 脈法

脈離口而脈弱小便復利身有微熱厥者難治

寸口脈微而數微則元氣亡則榮虛亡則血不足也

則胸中冷故吐

### 奔治例

丹溪曰胃中<sup>有熱</sup>三陳湯加炒梔子姜炒黃連生薑煎

服<sup>或加木香香附神曲</sup>

凡嘔吐者切不可下逆之故

有久病吐者胃氣虛不納穀之生薑參荳蔻香附治之

凡痞滿短氣而嘔調中益氣湯

夜月嘔吐五苓散姜汁湯調服

吐虫而嘔用黑錫炒成灰枳櫛末米飲調服

痰熱惡心嘔吐氣盛者道痰湯加縮砂姜炒黃連升麻

如服痛脾痛右關脈弦嘔吐不已此木來土之象寒水外

榮青芍芍縮麴陳半苓甘之類

時常吐清水或口甘不喜食冷涎自下而湧上此脾熱所致

三陳加木芍外施苓也神曲麦芽生薑煎或丸可

如時常惡心吐清水心胃作痛得食則暫止飲則甚者



此胃中有蛇之三陳加練根史君子煎服或黑錫灰枳樹末  
米飲調下。

噎膈

經曰三陽結謂之膈

子扣云三陽者大小腸膀胱之結熱結

小腸熱結則血脉燥  
大腸熱結則不固  
膀胱熱則津液涸

陽既結則前後閉塞下既不通必及而上行所以噎膈不  
下縱下而後知此陽火不下行而上行之故經又曰少陽所  
致為吐湧益食不下此理明矣

或

咽喉室塞食不下其病在咽  
食下則胃脘當心而痛腹更甚食不下其病在胃  
食物不下良久後知其病在胃中焦之膈噎  
朝食暮吐暮食朝吐其病在膈門大小腸之間此下焦之膈噎

夫氣之初病其端甚微

或

自吐少飲食不護  
外胃凡兩  
內傷七情  
食味色厚偏助陽氣積成膈熱  
痰氣充塞表裏無行  
性急易怒相火上升

以致津液不行清濁相干

惟氣之為病或

不思飲食  
噎膈各嗽  
噎膈痞悶

醫者不察其本及認為寒  
遽以辛香燥熱之劑投之病  
被初暫開或半月或一月前  
証候作如此延遲者自氣成積  
自積成瘕此為瘕為飲為吞  
酸之由之良工未遇誤藥又行  
痰挾瘀血遂成窠囊此  
為瘕為痛為吐膈噎及  
胃之次也

醫者必謂虛而積寒非尋常中不可療竟以烏附佐丹  
劑考意服久之血液俱耗胃脘乾枯大便秘必若羊屎

又曰噎病生於血乾血陰之陰主靜內外支靜則亮府之火  
不起而金水二秀有養陰血自生腸胃津液倍化金宣何

噎之有妄以燥熱之劑以清火則何以異刺入而殺之

合脉法脉結曰寸緊尺澁其人胃滿不食而吐

胃法者虛之胃氣元余

跌陽脉浮而澁俗則虛脾傷則不磨飲食暮吐暮食朝吐

宿穀不化名曰胃反脉緊而澁難治

脉大而澁不足

弁治例

丹溪曰天率屬血虛戴氏曰氣虛者脉必緩而澁加

有痰

張雞峯曰噎當是神思間病准內觀以自養可安此言深

中病情

。尿細羊屎者不治大腸无血故

年五十余則不可治矣

戴氏曰氣血俱虛者則口中多黏沫但見沫大者必死

。治法用童便韭汁赤蘆姜汁牛乳煎尿氣虛者用童子湯切不可

用香燥藥宜薄滋味

。有氣結者用開胃之劑

積血者當消息去之韭汁能下膈上瘀血

。人參利膈丸治膈噎胃中不利大便結燥痰喘喘滿脾胃

壅滯推陳致新治膈氣之聖藥

不香 枳榔 各三分 參 歸 薑 甘 實 各炒黃 各一兩 大黃 開濕蒸

朴 各二兩 右細末為丸溫水下

。丹溪法合、胃中覺有熱則三陳加土炒參苓仁桔梗之類

血虛瘦弱二陳合四物加杏紅童便韭汁不可缺

飲酒人三陳加砂糖砂尿

如（朝）食（暮）吐（此胃可容受而）加姜蘇神曲或二腸秘結不通

食返而上奔三陳加酒蒸大黃堯仁之類以潤之

氣虛肥白三陳合四君子湯加升麻姜汁

七情鬱結氣噎者三陳加香附芎不香換姜縮之類

凡膈噎大便燥結用大黃乃急則治其標之劑

仍用四物加童便並汁及飲牛羊乳為上藥但不可以人

乳代之蓋人乳內有（飲食無飽之）存於中

或人年五十三及秋間得噎証胃脘痛食不下或食下

良久後方大便燥結人黑瘦（右關前病而後關後病）脈（左三部俱沈弱是氣結）予

曰此中氣不足不氣來侮主

上焦（濕熱鬱結痰瘕）陰火上升吸門故食不下

用（四物以生血）三合（成劑）姜炒麥冬炒枳實姜縮（間圓腸）羊

二陳（補氣）年服直著貼病全安

楊柳殆氏婦年四十身材畧瘦小勤於女工得膈噎証半

年飲食絕不進而大便燥結不行者十數日小腹隱々然痛

診之六脉皆沈伏生桃仁七令細剪生韭汁一盞送下片

時許病者去骨中畧見寬舒以四物湯六不為姜仁二不桃仁

泥半不煎煮大黃一不酒紅一分煎成正果一盞取新溫羊

乳汁一盞合而服之半日後下宿真若手明日腹痛止漸

進稀粥而安後以四物湯加入城合羊乳打服五六十貼而安

韻會饒與饒通氣上逆作声之名之饒於立切

經曰諸逆衝上皆屬於太

饒

丹溪曰饒病氣逆之以其氣自臍下直衝上出於口之名之

東垣謂火与元氣不兩立又謂火為元氣之賊

古方以胃弱言之而不及火且以丁香柿蒂女茹陳皮等治之

之未審孰為降火陰氣傷胃為養胃土損傷則木來

侮之矣謂之土敗木賊

言胃弱者陰弱之虛之甚之病者見此以為危証依正法而治之者尚不保其一二而況誤醫者乎

雖然亦有因實而為飢者不可不審

或有飲食太飽填塞胸中而氣不得升降者

傷寒起病陽明四逆之期失下清濁不分所以氣不宜通者

若此者皆實証之聲也心當虛實治之不可妄信以夫人之天年

### 肺法

肺浮而微者易治  
肺強而搏之而不鼓者難治

脉微

微皆可治

右關強者木乘土位難治

### 奔治例

丹溪曰大率有氣虛者視有余不足治之用  
痰與食在上者吐之

不足者補參人參白朮湯下大補丸

飢逆自利滑石甘平芍栢參朮陳皮亦瀝

痢飢逆參朮湯調益元散頻服

傷寒餘熱未解氣虛發飢甘參陳茹加姜枣煎服

氣虛有痰發飢陳半干姜參通右煎服

一方治同証三陳加參朮名六君子湯入姜枣煎服

### 丹溪法

#### 傷寒發飢有四

陽明內實失下而發飢大承氣下之而愈  
陽明內實失下而發飢大承氣下之而愈  
陽明內實失下而發飢大承氣下之而愈  
陽明內實失下而發飢大承氣下之而愈

### 灸法

乳根二穴直乳下一寸六分婦人在乳房下起肉處陷中灸七壯効如神  
氣海一穴直臍下一寸半灸三七壯立止

攻補之別治

東陽李氏子病傷寒陽明內寒醫者補其治而愈然十日

後予珍其脈長而實大主大寒氣陽天下之熱退而飢亦止

鹽松周氏子得傷寒証七日熱退而飢亦止不絕舉家傍徨

予珍其脈六脉皆沈細元力人供甚以補中益氣作大劑加

炮附一不二日三貼炙乳根氣海當日飢止脉亦充而平矣

吞酸

經曰諸吐酸皆屬於熱惟東垣獨以為寒病一偏之見

河方曰酸者肝木之味之由火盛制金不克平不則肝木自甚

故為酸之如飲食熱則易於酸矣是必肝熱則口酸

或言為寒者但謂傷生冷硬物而喜噯醋吞酸故俗醫主

於溫和脾胃胃宜知人之傷於寒則為病熱蓋寒傷皮毛則

腠理閉密陽氣怫鬱而為熱証故傷寒熱在表以麻黃湯

熱茶發散腠理開通汗泄熱退而愈

凡內傷冷物者或

但陰勝陽而為病寒

寒也相持怫鬱而為病熱

內傷冷物及病熱得汗泄熱退身涼而病愈

微而止為中酸俗謂之酸心法宜溫散亦猶傷

寒解表之義

若久喜酸不已則不宜溫宜以寒茶發後

以涼茶潤之結散熱去則氣和矣所似中酸

不宜食粘滑油膩者謂之食氣許不通暢

如食物在胃後蓋熱而自酸宜食新食

菜蔬忌食氣之通利之藥於斯明矣

脈法 脉弦而滑、兩寸或浮而弦或浮而滑或緊而洪

或 沈而遲胃中有寒飲

店例 酸味宜厚味必疏食自春則病易

食前 有痰三陳加南芥

治吞酸 同食前所致生料平胃散加炒神曲炒麦芽姜東煎

治腹必用吳茱萸煩其性而析之

。萊連丸

吳萊 去梗湯泡 浸半日

陳皮去白 苓

陳壁土炒 各五兩

連土炒 一兩

木米泔浸 七名半

右為細末神麴糊丸津液嚥下一方（熱月倍連）木苓為神

助和飯為小丸吞之

吐清水三木土炒 苓滑陳 煎服

。痰為患吐眩悸或食生冷硬物脾胃不和吐酸水三陳加丁文 一方細切萊連一兩吳萊二兩同井水浸七日去連將萊焙乾每 日清晨以米湯下四十九粒

痞滿

痞食積 痞痰 夫痞滿之証不可執三洋脈証虛寒而謂

丹溪只

痞滿 痞滿

不同痞則內覺痞悶而外無脹急之狀 也蓋由陰伏

陽蓄氣血不運而成位心下之中腹滿痞塞皆土邪之所為耳

有

因誤下裏氣虛邪乘虛而入心之分野 因食痰積不化施行而作痞者 濕熱太甚土來心下而為痞者

。脈法

右關多弦弦而遲者必心下堅此肝木剋脾土結涎閉於痞痞 氣不舒則痞

。微

。女在

陽氣不足中風汗出而煩躁

陽微不可下 下則心下痞堅

。奔治例

連奔實之 苦以世之

用

補薑半之辛以散之 參木之可溫以補之 苓沃之鹹淡以誘之

大藥互濕同治使上下分消

痞有痰挾血成窠囊者用桃紅香附大芩之類

七情所傷憂思鬱結府痞氣不和乎心脈痞悶 半苓朴

蘼入生薑煎

。丹溪活套

凡心下痞滿須枳實萊連如（肥） 人心下痞

內有濕飲宜不痞半苓滑 乃難治在上焦矣連以到

如脾氣虛弱將運不調飲食不化而作痞者白朮不山查神曲

表芽以消之

。飲食填塞胃中而作痞者東垣枳實芍藥散凡不香化常

陽之類

傷寒下早而作痞積穀枳枳湯小陷胃之穀  
傷寒下多則亡陰而痞者四物湯加參苓白朮升麻索  
胡少佐以陳皮枳殼

大病後元氣未復而胃滿氣短者補中益氣湯陳皮枳木  
丸類

腫脹

經曰諸濕腫滿皆屬於脾又曰諸肢脹皆屬於熱

夫脾虛不克制水之債妄行故通方面目手足皆浮而腫

或服大如鼓而面目四肢不腫者

水腫皆  
名曰  
脹滿

脾土濕熱為病

脾重也

丹溪曰心脾陽也居上脾居中也陰之屬土經曰飲食入胃游

溢精氣上輸於脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱

水精四布五經並行

脾是與神靜之德而能使心脾之陽降而後天地之氣是為平

人令

七情內傷

六淫外侵

飲食不節

房勞致虛

脾土之陰受傷轉輸之官失職胃氣受擊不能運

故

陽自升而成天地不交之否清濁相混遂乃壅塞

濕鬱為熱又生濕熱相生遂成脹滿外多堅滿

養肺以制木使脾無賊邪之虞

滋腎以制火使肺得清化之令

却煩味以防助邪

斷妄想以保母氣

遠音系戒暴怒

九有不妄

醫者不察急病獲効

喜行利業以速通快殊不知寬得一日二日

依脹愈甚真氣已傷去死不遠矣

俗謂氣元補法者以其痞滿壅塞似難於補不思

正氣虛而不思

所以為病

此者氣行則愈

氣虛不補利何由退病何由安

且此病之起固非一年根深蒂固欲取速效即求禱耳

知王道者可與語此

或受病之淺脾胃尚壯積滯不固者惟可畧與疎導而不可峻與利某

愚按

先生此論詳明殆盡誠千古不易之定議

東垣以歲寒生滿病

北寒熱不同難以論

然愚嘗按丹後論人多矣

脈法脈大堅以滿者脹遲而滑者脹閉上脈虛則內脹

或傷而致皆脹

丹後曰水腫脈多沈伏病

陽水為陽証

脈必沈

煩滿小使赤澀大便秘結

此為陽水

水病脈大如鼓脈

實者生微細者死

中惡脈大四肢滿脈

大而微者生

唇腫齒黑

掌腫无紋

臍腫凸出

缺盆平

奔治例

朝寬莫急血虛

朝莫急血虛

治腫脹大法宜

人參白朮為君

蒼朮陳皮茯苓為臣

以制肝木少加厚朴以消腹脹

茯苓麥門冬為使

氣不運加不香不運

氣下陷加升柴提氣

血虛加補血藥

痰盛加利痰藥

隨証加減用之无不効

盧氏醫鏡



治法宜

清心經之火  
補養脾胃去全運化之職  
脾氣下降降火為開通

其精之

清者後回帶為氣為血  
為津液  
敗濁者在下為汗  
漸而分清者

仲景之法腰

已上  
已下

腫者宜

發汗  
利小便

東垣曰宜以

辛散之  
苦泄之  
淡滲利之

使上下分清其經之所留

開鬼門  
潔淨府

謂熱也

產後浮腫必大補氣血少統以蒼朮茯苓使氣自降大劑白朮

補脾壅滯者用半反陳皮香附

有熱當清肺金表以

芩苓之屬

熱水腫用梔仁炒末米飲調下三五不

若胃脘熱病在上者連設用

丹溪活套

凡服須用姜制厚朴肥人脈脹必用利濕蒼朮茯苓滑石

色白人脈脹必是氣虛參苓不苓

色白人脈脹必是氣虛參苓不苓  
瘦人脈脹是熱必連苓梔朴

如因有故蓄血而脈脹桃紅之類

如因食積脈脹木香枳榔阿魏之類

如外寒鬱內熱而脈脹者官桂升葛之類

如目多怒氣脈脹者蒼朮撫芎香附青皮芍藥之類

脈脹初得是氣脈宜行氣疎導之劑不枳殼青陳朴

祖傳經疏雞屎醃拍鼓脹氣脹水脹

鵝雞屎一味研細炒焦地上火毒每研極細百沸湯三升

淋汁每服一盞調木香枳榔末一不日三服空脈服以罕為期

寧戒之例

予一兄素能飲酒年五十得腫脹通身腫脈脹尤甚小便

淡而不利大便滑泄召予治予曰戒酒色溫腎此病可保无

危不然去生漸遠見白自今戒起予以丹溪之法參苓不為君


加利水乃制肝木清肺金等藥十貼而小水長大使寒腫退而安又半月有二便身平日月飲酒者曰木氏泉者素不飲酒山中之鹿耳我兄水中之魚鹿可取魚亦可取水乎三人遂痛飲沈醉而止次日病作甚於前依求治予曰不可為矣二月而逝

梅林妻姪孫珞智得腫脹証亦令戒前四更前法服藥四五十貼而愈願於五年一日嘆曰人不訖塩腎而死仍異遂用塩十數日後回病大作再求治亦許踰月腫脹而死予用丹溪之法治腫脹愈者多矣不克盡述特居此二人不與禁者以為後人之戒

**積聚**

積者陰陽氣之積聚名曰積  
聚者陽氣之積聚名曰聚

故積者五勞七傷所成也始發有常處其病不離其部  
聚者六府所成也始發無根尋其痛或隱或見



或盛食多飲則脈傷


若起居不節用力之妄則

陽絡脈傷則血內溢則便血  
陰絡脈傷則血外溢則衄血  
腸胃之絡脈傷則血藏溢於腸外腸外有寒汁沫與血相搏則氣聚而成積矣

或外中於寒內傷於憂怒則氣上逆氣逆則六腑不通溫氣不行凝血滯果不散津液凝滯傷者不去而成積矣

治者當察其所痛以知其應有餘不足可人補則

詳考府之上下



全其真氣而補益之隨其所利而行之節飲食慎起居  
和其中外可使必已不然後以大毒之劑攻之積至五積不復  
正氣進復可不復

脉法 脉經曰 脉來細而附骨者積

脉出在右


積在右

肺支

積在中央


各以其部處之

肺支



今并治例

丹溪曰 魂乃有形之物氣不亡成形成在右



以熱之堅以劑之行氣開痰為主  
二方治積塊 海石三稜莪不香附各醋 桃紅五靈之類為末湯下

治魂在右

危重子已崩血塊次消痰

積塊不可專用下索使損其元氣病亦不去

凡婦人脈中有塊多屬死血

倒倉法全籍自飲輪迴酒十數杯以祛逐餘垢迎接調勻新

布榮衛使秀氣育膜生志數暢有脫胎換骨之功多服

其機因致中輟而功虧一簣若非明物理通造化者其肯

視為養醞良味乎

愚詳此法名倒倉謂傾倒倉廩之陳腐

惟脾胃大小腸有食積痰飲而為腹痛痞痞癰食瘧

黃胖痞滿惡心噎氣嘈雜吞酸等症行之无不應手獲

効

其餘二應氣血虛損子夫及胃膈噎鼓勝脹勞瘵真病

已成及肥白氣虛之人或一切証候脉虛軟無力者切勿輕

誠以自招咎

虛損

經曰



若夫七情五心之火飛越男女声色之欲過淫是皆虛損之所由也

概要里虛損之疾寒熱即虛而感

感

寒則損陽陽虛則傷

陽虛則傷

盛損自上下

損損于腎

治宜以辛甘淡之

損于

心脾虛少不榮肺肺婦人月即

損損于腎

治宜以辛甘淡之

損于

肝筋緩不怠自收持

治宜以苦酸鹹之於脾則不

可治

又曰

心脾損而色弊

腎肝損而形痿

益其衛氣

雜註曰治損之法損其

脾者

潤其飲食通其寒溫

是皆虛損回証治法之大要也學者詳之

脈法

脈經曰

脈來

有為虛

弦者為中虛

脈來細而微者血氣俱虛脈小者血氣俱虛

要略曰

脈沉小者脫血

血虛脈大如葱管脈大而孔者脫血

金并治例

丹溪曰天之大氣

地之陰氣為血故陰常不足

人受天地之氣以生

天之陽氣為氣故陽常有餘

血常不足

經曰精不足者補之以味。陰補精以陰求其本。

味乃穀菽菜果出於天賦自然冲和之味故有食人補

陰之功非醯醬烹烹飪調和偏厚之味出於人為者。

經曰陰之所生本在五味非天賦之味乎。

善攝生者不可謂味以補精而遂恣於口腹以自速其禍。

經曰形不足者溫之以氣溫養之溫存以養使氣自充氣充則

形完矣。曰溫各有其旨為方悉以溫熱佐輔名曰溫補宜

理也哉。

人年老或虛損精血俱耗陰不足以配陽孤陽幾於亡

越天生胃氣尚尔雷連又藉水穀之陰故羈而定耳。

丹溪治老人虛損但覺水短少即是病進。

人參 白朮

牛膝 芍藥

陳皮 茯苓

春加芍藥及麥冬秋冬加歸身  
依信生養一日或二貼水之長養四  
乃止此老人養生之捷法。

治氣虛四君子湯

參 苓 白朮 甘草

右水煎如自煎或水不利者去苓加蒼二不元汗小

水不利者仍李方

治血虛四物湯

歸 芍 熟地 白朮

右水煎

倍

治氣血兩虛八物湯

四君子

湯合為一劑加減如上法煎服

十全大補湯治氣血俱虛而挾寒暑

參 苓 芍 甘 之 四 味 乃 四 君 子 之 治 氣 虛

歸 芍 芍 地 之 四 味 乃 四 物 之 治 血 虛

茵之一味補陽衛之耗竭益肺氣  
桂之一味補陰榮之涸乏益心血  
補氣陽治氣虛脉浮而軟怔忡無時

茵二分 人參 甘中 各一分 炙甘草 各一分

桔梗 各七分

右細切一服加生薑三片煎溫服

東陽邑痒教先生一証發大汗戰鼓慄振片時許發燥  
熱身如火燒又片時許出大汗如雨身體着冰冷而就  
發寒戰如箭寒後又熱後又汗三病繼作而晝夜不  
息二醫作瘧治不効召予診右手陽脉數而洪有力  
陰脉畧沈小而亦虛左三部比右差小而亦多軟予曰此  
陽虛証用補中益氣湯倍參芪 減柴桑一加炙甘草生附子一不  
半炒芩栢三分干姜薄桂各五分大棗一枚同煎二服而  
病去三分三服而減半而服寒熱止而身尚有微汗減去  
桂附姜一半服二貼全愈

勞極

經曰陰虛生內熱

陰氣者靜則神志  
躁則消亡

飲食自信腸胃乃傷

有所勞佚

形氣衰少  
穀氣不盛

上焦不行下脘不通而胃

故欲養陰而延生者

飲食宜適中而無傷  
風寒暑濕之謹避

何勞法之有哉

今也

嗜欲無節起居不時  
七情六欲火時動于宗  
飲食勞倦之虛傷乎

漸而至于真水枯竭陰火上

炎而發蒸之之燥熱或寒熱進退似瘧非瘧古方名曰蒸

病或二十四種三十六種名証雖多

大抵不過咳嗽發熱咯血吐血白濁白淫遺精盜汗

婦人則月閉不通

日漸危

羸漸成勞極之候夫病此者殆多矣夫始息者冬直至發熱


各等分加生  
姜大棗煎  
加減法如左

不休形體瘦甚其真氣已脫然後求醫急倉扁後生莫能救其方一良可嘆哉

雖然二人未足憐況其侍奉親密之人或同氣也松之屬意陶日久受其惡氣多遭傳染名曰傳屍雖然未有不由氣體虛弱勞傷心腎而得之者初起於一人不謹而後注數十百人甚而至於滅門矣

其熱毒耐積之久則生異物食人乃府精華變生諸般奇形誠可驚駭

是以勞傷于



凡人覺有此証便宜早治緩則不及更矣

治之法

一則殺其虫以絕其根本  
一則補其虛以復其真元  
分經用藥各有條理

命脉法、脉証曰男子平人脉大為勞極虛亦為勞

男子勞乏為病其脉浮太手足煩春夏劇秋冬瘡

男子平人脉虛弱微細者喜盜汗出

男子面色蒼白主渴及亡血卒喘急悸其脉浮者裡虛

男子脉虛沈弦元寒熱短氣裡急小使不利面白時目暝

此人无血示脈滿此為勞使然

男子脉微弱而淡為元子精氣清冷

脉沈小遲者名脫氣其人疾行則喘喝而股逆寒脈滿甚

則澹世食不消化

脉弦而太

法則為強則為寒大則為氣則為虛虛寒相搏此名為羣婦人產後下男亡血失精

并治例

丹溪曰此陰虛之極痰与血病由物湯加童便升麻姜汁

身瘦屬火因火燒燥肉脫甚者註信

氣血虛甚發熱成勞者補天九加骨蒸藥使

骨蒸藥知柏地骨黃連秦尤青蒿鱉甲石膏桑白楊

補天九此河車一具即產孩胞衣

男用女用男胎者為勝

但求肥盛无病婦人者可用

初取長流水洗淨去筋膜以蔑籠盛之外以紙糊使

不泄氣焙乾要用時以米醋浸一宿焙乾用

右芙蓉龜板各二五杜仲牛膝陳皮各二五姜五五五味子

二五各細抹同河車每研和酒糊為丸

青蒿飲子治勞瘵

青蒿一斗五升童便三斗

一云氣虛加補氣藥血虛加補血藥

右以文武火熬約童便一斗去膏每熬至一升加辰砂拱柳末

三五升熬熟沸甘中末投之每服一匙清湯點服極妙

白銀塵一味大錢療虫疳入丸藥散中用

射香散治男婦骨蒸發熱五勞七傷等証

天葵蓋

二不紫胡一犀角屑半寸甘中三寸東門桃枝各列柳枝

東門柳枝

青蒿各一阿魏一不列研薤白薤白各七寸射香二不

右細切杵為末用童便二升半浸一宿明日早煎至一升

半去粗分三服每服入熱末三不溫服五更初各二服人行七

里每服若惡心元元欲吐嚼白梅止之男病如煎女病男

煎服後厚出惡物異虫忌風及油膩腥麪酸牛羊雞

猪犬肉魚腥二月

年遠重病亦三服全安

服藥必利下惡物併虫以盆盛之用火燒殺之或油煎殺之

病人所穿衣服及厚褥忌易燒之

服藥後多人哭泣相別是其驗

取下虫其嘴紅者可留青黑者不問但可絕後人之信証耳

紫胡散治虛勞



紫人苓桔芍 歸

酒浸

青

去白

麥門 各二升

右細切作一服煎溫服

### 五蒸湯

人知 苓 各一升 亦煮下片

生地

干薑 各一升

苓 一升

炙半

石膏 二升 粳米一合

右細切先以水三盞煎小麥二合至二盞去麥煎藥至一盞

溫服隨証加減于後

寒熱加苓連栝大麥

虛熱加烏梅秦尤紫胡青蒿牡丹皮鱉甲

肺蒸鼻乾加烏梅天門冬門紫苑茸

大腸蒸右鼻乾乾痛加大黃芒硝

皮膚蒸右白唾血

加石膏

赤白

膚蒸昏昧嗜臥

加牡丹皮

氣蒸鼻乾喘促遍身氣熱加人參梔

### 心蒸、舌乾、加地連

小腸蒸下唇焦加赤茯苓 生地 木通

血蒸、發熱

加生地

桂

童便

肺蒸

咳白痰詰脈絡

加生地

生地

脾蒸

腹脹急不調

加生地

生地

胃蒸

下痛

加石膏

粳米 大黃芒硝 干薑

肉蒸食无味而嘔煩躁不安加白芍

肝蒸眼黑加歸芍 前胡

膽蒸眼色白加紫胡栝蒌

筋蒸

甲焦

加歸芍

三焦蒸

下熱

加石膏 亦煮下

胃蒸

兩耳焦

加生地 石膏

膀胱蒸

右耳焦

加沃苓滑

腦蒸頭眩熱悶加生地防風羌活

髓蒸髓沸骨中熱如生地歸天門

骨蒸齒黑腰痛足逆要出食勞如驚甲地骨牡丹屏生地

腎蒸肢細肢腫布為俱熱如石膏黃芩柏

胞蒸小便赤黃如沃苓生地滑石沈香

丹溪活套云勞極之証立參必得重於一經

足腫痰疼腰背拘急遺精白濁面色黧黑耳輪焦枯脉

沈細數知其邪在腎

四物湯加知柏五味麥門天門以厚杜仲肉桂之類入童便韭

汁并瀝

心神驚惕怔忡無時盜汗自汗心煩熱渴口舌生瘡咯血面赤

脉洪而數知其邪在心

前方去杜仲以桂枝茯苓神胡黃連蓮心遠志菖蒲石砂類

咳嗽喘促衄血嗽血皮膚枯燥鼻塞声沈時吐痰沫脉微虛

而瀉數知其邪在肺

四物湯加沙參麥門五味知母貝母桔梗桑白地骨款冬紫苑

馬兜百合百部之類入童便并瀝韭汁

眼痛目赤面青頰赤多怒虛陽不飲夢多鬼交甚則卵縮筋

急脉法而數知其邪在肝

四物湯加升芍龍胎紫胡芩苓青皮并桑白類

面色萎黃唇焦燥飲食无味肢痛腸鳴泄利四肢倦怠脉

虛濡而數知其邪在脾

四君子湯加酒炒白芍蓮肉薏苡干山茱萸沢白扁豆之類

凡骨蒸勞熱元氣未脫者灸膏肓四花穴元有不安者之

眩運

經曰諸風掉眩皆屬肝木

大抵人

肥白而作眩者治宜清痰降火為先而兼補氣之甚

經曰風勝則地動風不太之歲亦有因其氣化而為

外感風邪而眩者治法

祛風

宜 順氣 伐肝 為良藥 專 降火

外有因吐血而眩暈者，胃中有死血，迷閉心竅，驚然是宜。（行血）

自安醫者宜各類推而治之

左手脈 數熱多法而洪者，無與人迎緩而得，太屬風

右手脈 案有痰積虛大是久病

舟漢曰 痰在上

無痰不能作眩

雖有目眩者亦必有痰、氣虛者亦以治痰為主。補記

大動其痰三陳湯加苓、木香

去血已多而眩暈者，宜歸陽

眩暈不可當者，以大艾酒炒，為末茶清調下。急則治其標

立君湯治氣虛痰盛，急按風邪眩暈不休者

陳皮 去白

半斤

湯泡

苓 一不

甘炙半

荊芥 半不

右細切作一服，加生薑、大棗煎溫服

吳合湯治風虛眩暈，四物加秦艽羌活

身不陽治冒雨中濕眩暈，吐逆頭痛，不食，手延

芎 半

不 合一不

甘 六

右細切加生薑七片煎溫服

小芎散治風眩暈，山茱萸、羌活、山茱萸、甘菊、人蔘神小芎

右細末每服二不溫酒調下

舟漢治本

眩暈者中風之漸

肥白人氣虛，按痰四者，三倍密矣。其甚加半橘，或少加芎，芥以清頭目

痰盛而挾氣虛三陳加參，密不或少，加炮附片、牛瀝、薑汁

休瘦血虛痰大，甚盛三陳，合四物加苓、芎、煎、亦瀝、薑汁、薑便

諸般眩暈，按熱、風、防風、制介、天麻、秦艽、之類，無有不效者

附子

# 頭痛

經曰新沐中風則為首風又曰首風之狀頭面多汗惡風  
金匱真言論曰東風生於春病在肝俞在頸項故春氣  
病在頸

又曰諸陽會於頭面夫風從上受之風寒傷上部後外入客  
於經結令大振寒頭痛身重惡寒治在瓜池風府

調其陰陽不足則補汗之則愈此傷寒頭痛之

頭痛耳鳴九竅不利者腸胃之所受乃氣虛頭痛之

心煩頭痛者病在膈中或在手巨陽少陰乃濕熱頭痛之


氣上不下頭痛癰疾者下虛上實之在足少陰巨陽是  
則入腎寒濕頭痛之

頭半寒痛者先取手少陽陽明後取足少陽陽明此偏頭痛之

真頭痛者甚則腦盡痛手足寒至節者死不治

欲逆頭痛者所犯大寒內至骨髓者以腦為主腦逆故  
令頭痛蓋亦痛之

凡頭痛皆以凡氣治之者總其大休而言是之  
然亦有三陰三陽之異



血虛頭痛 芎藭 為主氣血俱虛頭痛調中益氣湯加芎藭

白不半冬麻湯 治風濕熱頭痛 如濕氣在頭者以苦茶吐之

脈法經曰寸口脈中短者頭痛之

脈經曰陽弦則頭痛之

又曰寸口脈浮中風發熱頭痛  
脈緊頭痛是傷寒

脉决曰頭痛短瀉須死

并治例

丹溪曰頭痛多主於痰 痛甚者火 多宜清痰降火

諸証氣滯亦作頭痛宜分經理氣治

偏頭風在

右屬痰用蒼朮半斤  
左屬血虛用剉芥薄寸

諸家不分即屬故葉多

少陽偏頭痛者多大便秘或可下之

一方治風濕熱頭痛神効

片苓一两酒制炒 蒼朮 羌活各五 蒼耳子三 細辛二

右細末以生薑一斤搗和末末三茶清調下

一方有生甘酒連川芎炒半斤无風細

一方治少年強壯人氣實有痰或頭暈面重痛立効

大黃同拌炒乾每持三次

右細末湯調下

一方治眉稜骨痛屬風熱之痰

白芷 片苓酒制炒

右等分細末茶清調下

一方治眉稜骨痛不可忍神効

羌活各二 片苓一 酒序一 茶一 冬一 不用

右煎食後服

羌活湯治風熱壅盛上攻頭目昏眩

炙甘草一 白芍三 酒梔四 紫五 防風酒 茶酒 連卷

右細切作一服煎食後或臨卧服

一方治頭風熱痛不可忍

片苓三 酒梔炒 羌活炒 芫花炒 小芎一 芒一 茶芽一 荊芥一 薄荷一

右細末每服二茶白湯或茶清調下

丹溪活套

凡治頭風必以二陳湯加蒼芷為主



肥瘦人頭痛 必是濕痰 是熱上壅

半夏蒼朮 酒洗片苓 如形瘦色紫頭痛宜導

感冒 頭痛 加瓜蒌葉升柴葛 氣虛 宜菖參東垣安神湯 煩顛痛者宜葉本而炒升紫

心痛

經曰不通於食民病胃脘當心而痛蓋土敗不賊之候也 是以清陽不升 而肝木之邪得以乘機侵侮而為病矣 致病之因或口腹行辛酸滯阻而煎搏痰食寒涼生冷朝傷暮損 日積月深自胃成積自積成痰痰大煎熱血亦妄行痰血相雜 妨碍升降故胃脘疼痛吞酸噯氣嘈雜惡客膈噎及胃 俗醫不究其原例以辛香燥熱之劑治之以火濟火遂成危劇

古方九種心痛曰



痛夫所謂冷者惟一耳豈可例以熱藥治之乎

詳其所由皆在胃脘而實不在於心 有真心痛者 大寒虧心 手足青之節者且發且死

合脉法脉絀曰陽微陰弦則背痛痺而痛責其虛

脉短而數者心痛 瀉者心痛

心脉微急為痛微大為心痺引背痛

脉浮大弦長者死

合并治例心痛即胃脘痛源分新久

若身犯寒氣自得寒物而病於初得之時當用溫散溫利之藥 若欲行溫散溫利寧無助火添病耶

由是古方多用梔子 為君熱藥為之嚮導則邪病易去  
病安之後縱恣不政前非病必再作矣  
此病當日久不食不死

中官有食積是疾而生病者胃氣亦賴所養卒不便虛  
若痛方止即吃物病必復作勿得咎於醫之  
脉堅實不大便者下之亦不

心膈大痛攻走腰背發厥吧吐諸藥不効就吐中以鴉翎探之痰  
積疏許而痛即止

一方用藍葉榴細取汁合姜汁服

一方用青黛以姜汁湯潤服

一方海粉香附末以芫梔煎湯入姜汁潤服  
痛甚者脉必伏

宜溫藥附子類  
不可用參苓

諸痛不可補氣故

一方大梔九个炒食用水一盞煎七分入生薑汁令熱飲立止  
平日好熱物致死血流於胃口作痛以桃仁養氣下之

死血作痛延用玄胡桂心紅芍滑石桃仁

虫痛者必面上有白斑唇紅忌食時作一陳湯加棟根煎服

一方治痰積胃脘作痛

白螺蛳殼火煨

山梔

香附

尿浸

枳壳

炒黃

青皮

半夏

各五不

右細末蒸餅為丸服

春

秋

加

吳茱萸

一方治氣自腰脇間攻心痛不可忍腹中冰冷自汗肢重厥冷

大梔

四十九个連皮槌碎炒焦

附子

一枚炮去皮脂

右為末每服二小酒一盞煎八分溫服

舟車暈中豆蔻一味性溫已散滯氣利膈上痰若胃脘黑寒

痛用之如鼓應聲

因熱鬱而痛者理固不當用之但宜涼藥如苓連梔其功尤速

一男年廿五胃脘作痛形寒瘦食少而胃中常若飽予与加

味枳朮丸服不効日漸大痛叫號居聞四隣別以母妻之囑付

後喜欬自殺予与桃仁養氣湯作大劑連二服天下痰血四五碗

許困不言三日少稀粥漸時理病全安壯如前

脈痛

經曰寒氣入經而暫遲澀而不行客於脈外則血少故卒然而痛

東垣曰脈中諸痛皆因勞役過甚飲食失節中氣不足寒邪乘虛而入故卒然而作大痛

此更難知曰傷寒

中脘 小脘 大脘

少陰 厥陰

理中湯 吳茱中湯

四物湯 真武湯 附子湯

桂枝湯 當歸四逆湯

類

難病脈痛而物苦練湯而煮當歸丸

秋月脈痛肌

起惡寒脈沈寒桂枝芍藥湯 主之

原病式曰熱鬱于內則脈滿堅結而痛不可例言者寒

發汗不解醫反下之自而脈滿自利益甚脈病者桂枝加芍藥湯主之

大寒而痛者桂枝加大黃湯主之

小脈鞭滿而痛小便不利者則是高血之証也

其血虛瘦弱之人津液枯涸傳送失常鬱大壯熱前成結實

滯於二腸之間阻氣不運而作痛以枳實芍藥丸備急回之

欬先通其滯止其痛然後用四物等生血潤燥之劑以治之

心脈大痛欬吐不吐唇青厥逆死在頃刻此內傷食積是乾

霍亂之候之急以溫陽灌之鴉翎探吐驅涎而愈

若情痰多作于胸膈胃中已合人脈痛保和丸枳木丸

情氣在下者提之



脈并脈絀曰脈細小緊急病速進在中脈中刺痛

陰法脈痛 法急小脈痛 尺緊臍下痛 尺伏小脈痛

瘕痞 尺實小脈痛利

心脈痛不息脈大而疾者生

并治例 痛甚便欬大便去後則痛減食積之區散之



錦上痛而無增減者是寒

時痛時止者是熱

其痛常處而不移動者是死血

脈滑者是痰痰因氣逆而聚阻道不通而痛連痰解舒

一方治腹痛香附芎朮芒末姜汁湯咽服

白芍止治血虛腹痛餘俱不治其隨寒有收斂之功

氣虛人傷飲食而腹痛調補胃氣用參不偏

脈中常有熱痛此積熱滯胃氣傷或連振

小腹痛實痛青皮行氣

小腹因寒而痛桂吳茱

木香枳榔丸治食滯氣滯作痛

木槧各三青陳各五表月炒不實炒不朴姜制不

右細末蒸餅丸溫水下食之

芍藥甘中湯治四時腹痛

白芍 甘中炙

右等分細切入姜三斤煎溫服

无戎云腹痛脈



寒熱脈弦腹痛小柴胡去苓加白芍

舟車活套凡腹痛多是血脈凝滯不行必用酒炒白芍惡寒而痛加桂枝

腹痛欲飲物柱按者屬虛多木姜桂之類

腹痛手不可按者屬實建中湯加大黃

如飲食傷痛傷生冷硬物而作痛不香兒腹及三積積積元

如目跌撲傷損而作痛此瘀血証桃仁養氣湯之類

如酒後涉水血凝腹痛者大養氣加桂

一壯男寒月入水潤魚飢甚食涼粥腹大痛三晝夜不止一醫

與大養丸不通又與大養氣下冀水而痛愈甚予診脈六脈

沈伏而實面青黑予曰此大寒証及下焦有燥屎作痛先予



房勞辛苦而腰痛四物加知柏杜五味香大補陰丸  
風寒濕流注經絡而作痛三陳加麻蒼芎芷風羌獨  
剉跌撲瘀血流于本經而作痛四物加桃紅蘗木脉實壯者  
大養氣加桂

醉飽入房太甚而傷食積乘虛流於本經腰痛難伸仰  
四物合三陳加麥月神曲杜柏桂葛枳殼

腎着為病其体重腰冷如水飲食如故小便自利腰以下冷  
痛而重治宜流濕兼用溫藥

腎着陽治腎着腰痛 乾姜 炮 茯苓 各一兩半 甘中 炙半兩  
白朮 二兩半

眼痛

經曰肝病者兩眼下痛引小腹食善怒虛則目眩而血  
恐如人持捕

又曰怒則氣逆虛則吐血及衄世故氣上矣蓋肝火如  
不得經或隨氣而上於口鼻或為本經而為眼痛

或歲金有金而不氣被鬱皆能令人眼痛肝火急食辛以散之者  
傷寒發寒熱而眼痛者肝膽二經病之治以小柴胡必効

或清痰食積流注眼下部為痛宜於各類推而治之

合脉并脉注曰肝脉

肝脉

腰背痛足逆寒時瘧婦人月水不來

脉双弦者肝氣有余兩脈作痛

合并治例

屬肝不氣空同

丹溪曰眼痛

有死血同惡血停於肝居於眼下而痛病則自肝痛甚按之益痛  
痰流注目痰積流注於眼眶之經按眼上痛病則咳嗽氣急引眼痛

一方治木氣實者苦蒼青芍柴龍膽甘各等分煎服

一方治死血作痛桃名尖紅同梓焙芍青附厚皮青各等分煎服

一方治濕痰流注服痛三陳加南星蒼木芍生薑煎服

左服痛柴胡為君加芍青膽為佐使

右服痛甚服滿不食穀實為君芍桂為佐

五服走痛可遂大戰或白芥子

咳嗽服痛三陳加南星青香附黛姜汁或四物加青皮以疎肝氣

氣弱之人服痛肺或紫多從勞役怒氣得之入物如不香青皮或桂

去滯氣用青皮蓋青皮必解肝胆二經之實

肥白氣虛發寒熱而服痛用紫芍退熱青皮不香細切

瘦弱多勞發寒熱而服痛必瘀血宜挑紅紫青大姜類

一方治右服痛不之思實炒芍各五不右細末姜湯調下

一方治服下疼痛不可忍桂芍細葛風各各分芍殺麻人甘各分

右細切加生薑煎溫服

丹溪活套 肝不有赤小柴胡加青皮芍芍膽或成入青黛服之

### 九服痛

瘀流注、小柴胡倍半加橘南蒼苓芍

瘀血、小柴胡合四物加桃紅痛甚元氣壯實桃仁姜氣下生

性急多怒之人有小柴胡加芍芍青

### 諸氣

經胃百病皆生於氣



人身之正氣與血為配氣行脈外氣血並行周流乎一身之中循環

運氣不停而為生不息之妙利

經胃一息不至則統絀窮若內無七情之所傷何氣病之有哉

夫不善養生者五志之傷元時至起是以釀成膠痰固積留滯於

前大邪氣充塞乎三焦使氣血失其常候府元不立傳導是故外邪

得以乘虛而透襲致致情陽不降而諸般氣痛朝輟暮作而

為膠固之疾非良工妙手莫易治也

大抵

男子屬陽得氣易散  
如子屬陰過能多靜  
是以  
男子之病常有常少  
婦人宜調其血以耗其氣此之謂也

脉并

脉經

滑者多血少氣  
澀者少血多氣  
大者血氣俱多  
小者血氣俱少  
未大而堅者血氣俱密  
未細而後者血氣俱虛

代者氣衰、細者氣少、浮而絕者氣欲絕

尺脉濡而堅為血實氣虛  
細而微血氣俱不足也

下手脉沈便知是氣沈極則伏、濡弱難愈

或沈滑氣兼痰飲病之

弁治例

丹溪曰周流乎一身以為生者氣之方內無所傷  
外無所感何氣病之有

今近時氣皆是肺受火邪氣得炎上外無所感何氣病之有  
無降黃蘗清心甚而

轉成劇病

丹方例用辛香燥熱之劑以火制火谷將誰執

又曰氣无補法世俗論之

以其為病痞滿壅塞似難於補

不思氣虛者不能運行者而不思所以為病經見性者氣行則愈  
性者著而為病

苟或氣怯不用補法氣何由行

調氣用不香然不香味辛氣上升和氣散而不達固宜用之若限火

衝上而用之則反助火邪而病甚矣故當用羌活知母而少用不香藥

氣刺痛

稟受素壯用枳壳烏藥  
因氣不舒而刺痛用不香藥  
肥白人氣刺痛用人參白朮枳壳不香

解五莖諸氣益少陰經血炒黑梔子末熱湯和生薑汁酒下其効甚捷

清膈九治回濕熱氣滯 苓連 各五不炒香附 一五五不 蒼朮 二五

右細末江熟瓜姜去皮搗爛和丸白湯下

種子降氣湯治氣不升降痰涎壅塞氣滿氣痛等症

得甘炙前

姜製各半不

桂陳各白各

半

蘊子另研各

右細切加姜枣煎服

沈香降氣湯治陰陽痿痺氣不升降骨膈痞悶噫醋吞酸

沈四不砂仁炙甘草炙一二二不香附童便浸一二四不

右細末鹽湯調下

### 丹溪活套

治氣之法

在胸臆之間當為痞滿刺痛伏梁等証三陳加實連桔葉仁木香在下焦為奔豚七疝等証木方加菴仁山查梔子枳核面線在兩股攻藥作痛木方加青紫芍藥膠在中焦為痞滿脹急木方加不啻厚朴枳殼或平胃散手其數年氣

婦人胎前產後一切氣疾作楚而物為主加疎利行氣之藥

### 疝氣

大抵七疝為病若非房勞所致即是遠行辛苦涉水履水履水熱血得寒而凝滯於小腸膀胱之分或濕熱壅塞而流於足厥陰經古方一以為寒而化用烏附等熱藥為治丹溪獨斷為濕熱

此發台人所未發者

夫熱前子其有非常之痛故治法宜驅逐本經之濕熱以寒

同熱用之法立方如治即邪易退也

脉并經曰肝脉大急沈皆為疝

又曰三陽急為瘕

又太陽脉浮則病腎凡瘕

少陽脉浮則病肝凡瘕

脉經曰寸口脉弦而緊弦則衛氣不行寸口則惡寒弦緊相搏則為寒疝

### 丹溪活套

丹溪曰疝者畢丸連小腹急痛有痛在畢丸者皆足厥陰之

或

有形無形有聲無聲

自肅閣下皆以為寒蓋主收引經絡得寒則收而不行所以亦有陽水決水終身不病无熱故

大抵此証始於濕熱在經而至於久又得寒氣外束不得疏散所以作痛者只作寒濕證為未備

以烏頭梔子作傷風服之其効亦捷後用此方隨形証加減之無不驗  
梔子以降濕熱 烏頭以破寒積 况二物皆下焦之藥又按之止痛者屬虛

須加肉桂以姜汁丸服

一方定痼痛用海石香附為末姜汁調下

香穀散治小腸氣膈脹疝痛筋急陰股中痛胸臆不省人更

面 搗炒

枳殼 炒

沒藥 半兩

右細末每服一不溫酒調下不拘時併進二三服効

### 脚氣

經曰傷于濕者下先受之蓋脾主四肢足居於下多受其濕濕鬱成熱濕熱相搏其病作矣是以先從氣衝寒濕核痛起及兩足腫紅腫或惡寒發熱狀若傷寒筋牽掣痛是主候或一旬或半月後作如欲漸而致於是筋脈大如瓜瓠者

多有之東南卑濕之地比之皆是而山之高燥之方鮮

有 內外感而得者

所感無有內外之殊其為濕熱之患則一也

大抵病固有內外之殊而濕無表裡之異耳故為治者宜通用

蒼朮 白朮

厚朴 生地

木瓜 桂枝

羌活 獨活

之類

治其濕 去其熱 調其氣 利其血 煎用木通防己牛膝引藥下行及消腫去濕大法不可不知此

東垣曰濕淫所勝治以苦溫以苦辛發之透關節勝濕為尤以苦寒泄

之流濕清熱為臣

### 合脉并

脉

虛者風 陽弱者濕 陰弱者熱 微者寒 牢堅者寒

脉

散則目昏 結則目赤 緊則目眩 細則目昏

心則恍惚謬妄吐衄不食眠卧不安尤寸下小或下無者死  
腎則腰脚腫小便不通呻吟目昏頭暈氣衝胃而喘左足脉絕者死

并治例

枳加芩連大黃

热甚及天令暄热加石膏

有痰者并灌姜汁或南星

便秘加桃仁

小便秘結如牛膝

肥人加痰藥

有筋動於足大指上至大腿近腰結了此奉養厚自凡矣而作又當加

蒼朮南星

轉筋屬血熱。四物加酒芩紅芍。

羌活導滯湯。治脚氣初發一身疼痛或肢節腫痛便溺阻隔先

以艾葉燻之。後用粘痛湯以徹其邪。

羗 各一糸  
 独 二糸  
 防 已  
 尾 各七糸  
 大 二糸四糸  
 积 突 五糸

右細切作一服煎空心溫服

和痛陽治濕熱脚氣為病肢節煩疼肩背沈重骨節不利遍身疼

痛下注，足脛、臍痛、脚膝生瘡、赤腫膿水不絕，或痒痛皆治。

養一不人音參升葛蒼朮洛四甘苓同炒各一藻

防風歸知兩製沢猪各半不术

右細切煎空心服臨卧再進一服

祖傳經方治脚氣發熱惡寒手足腫脹大心煩倦痛兼垂死者

杉木節 四六  
栴檀 七枝  
大厥皮 順洗一五  
青橘葉 四十九片

右細切作一服用頻流水煎服一日三服至大便利美水病根除

未愈者數日再服之病根去為度

外以杉木橘葉不拘多少煎湯洗之神效

痛風

經曰

濕勝者

所謂痛痺者即今之痛風之諸方謂之白虎歷節風



丹溪曰大率曰血虛受熱其血已自沸騰或加之海不愛濕熱血得

寒汚濁凝滯不得運行所以作痛、夜則痛甚、行於陰之位以辛溫監以辛涼流散寒濕開通鬱結使血氣行、更能慎口節飲无有不妥者、

脉并 脉經曰脉陰而緊者痺  
少陰脉浮而弱

少陰脈浮而弱

弱則血不足 凡血相搏則疼痛如刺手  
浮則為風

或人脉盛小短氣自汗者歷節疼不可屈此皆飲酒汗出氣所致也

寸口脉沈而弦

弦則為肝

汗多水少因水傷心歷節痛而美汗改是  
歷節凡之

△弁治例

丹溪曰濕痰停血流注為病在下魚尾湯遠非身附氣挾不能行  
故用為外鍾者以為主治之非惟无益而有殺人毒

此病



治有先發頰明分腫與不腫可也

補新集

陽山

不可食肉、屬陽大能助火素有火盛者小水不能制

若食肉厚味  
上有遺精  
下有遺溺

新魚腥麪醬酒醋

大法用蒼朮南星川芎白芷獨活酒芍茯苓上者加羌桂枝梗更妙  
一法用四物湯加桃仁牛膝陳皮茯苓甘草白芷竜膽

如痛在<sup>上者屬風</sup>下<sup>者屬濕</sup>加<sup>羌桂枝</sup>膝已通

氣虛者加參朮龜板

血虛者倍歸芎以桃紅

有痰者加半反南星生薑

具疾者二陳湯加酒苓羌活蒼朮

目濕者用二木佐以升瀝藥汁及行氣之藥

或有濕鬱而周身走痛或關節間痛遇陰寒即發當<sub>下</sub>作濕鬱<sub>上</sub>治

白不一味酒煎服之其痛立愈

肥瘦人多是血虛氣弱

脉必沉

下部有濕脰痛用防己抄膽知和面是捷藥

肥人宜三南星瘦者茯苓

薄桂味淡老能棧行手臂領南星蒼朮等藥至痛處

一方治上中下痛風

連同炒蒼朮南星各二兩神麴炒芍各二兩防己芷朮各五兩

藏同炒桂枝行手臂卷各三兩防勝一兩五錢酒紅七五兩

右細末神麴糊丸壹服服

地等補血藥

凡日久痢後面脚痠軟疼痛或膝脰如鼓椎者此亡陰宜芍藥熟

丹溪曰股節脰痛

差獨凡荆麻芡芍芷蒼朮藏靈丹芥枳實葛根芍藥尾

右細切煎服下焦加酒栢婦人加酒紅

肘多和枳沢大脈脉候數有瘀血宜羌活芍藥和加大芩微利之

治血虛陰火痛風

治婦人背脊肢走痛赤芍一兩桂蒼朮各半兩香附炒芡栢各一兩

治走注疼痛丹溪方

威靈仙蒼朮桂枝羌活生朮各二兩甘草三兩

右和生薑水煎入童便亦瀝各半盞再煎熱服忌猪鷄魚麪

二妙丸治兩足濕痺疼痛或如火燎後足跗熱起潮至腰膝或麻痺

痿軟皆是濕為病此藥主之

蒼朮四兩栢二兩酒浸日乾牛膝二兩歸尾二兩草薢二兩已二兩

右細末酒麴糊丸和梧子太每服百丸空心溫湯下

一男年四十歲風濕得自虎歷節風身軀制疼痛且不能履地者三

年百方不効身瘦骨立自於死二日多與木通湯愈遂以

四物湯加木通服不効後以木通二錢對長流水煎汁飲服後一時汗身痒甚上体發紅丹如豆粒拳家驚惶隨手沒去如汗至腰而止上体不痛矣次日又於前煎服下体發紅丹如汗至足底汗乾後通身舒暢而无痛矣一月後人壯氣後步履如初後以此法治教人皆驗故錄以示後學

# 瘡証

經曰肺熱葉焦五勝目而受之發為瘡壁

心氣熱為脉痔則腫脹不能住地

肝氣熱為筋瘡故筋急而重

脾氣熱為肉瘡則胃乾而渴肌肉不仁

腎氣熱為骨瘡則腰膝不舉骨枯髓減

又曰瘡者獨取陽明一經陽明主五勞六府之傷主潤宗筋已束骨而利機關衝脉者任脉之海主濡諸竅谷子陽明合於宗筋陰陽總宗筋之會會於氣衝而陽明為之長皆屬於帶

脉而絡於腎脉故陽明虛則宗筋弛緩骨脉不行故足痿不

用之治各補其榮而通其胸

丹溪曰經謂

治瘡起於肺熱  
治瘡獨取陽明一經

蓋肺金性燥居上而主記畏火者  
脾土性濕居中而主四肢畏水者

火性炎上若嗜飲亢節則水失所養火寡于畏而侮所勝得木邪而

傷矣

木性剛急肺受熱則金失所養木寡于畏而侮所勝得木邪而

傷矣

肺熱則不毛管撰一身

脾傷則四肢不仁為用

厚南方則肺金情而東方不索何脾傷之有

補少方則心火降而西方不虛何肺熱之有

此 固能束骨而利機關矣治瘡之法无出於此

然天座作陽學味發熱凡病瘡者不徒治食味喜必不

保其安全

命脉并証胃肺痿脉必浮而弱其人欲飲不得飲咳則出乾沫久又則小便不利  
合併例、黃栢蒼朮治痿、要索、

濕熱、燥濕降火、劑黃栢蒼朮蒼朮不類

或二陳加蒼朮芩栢

血虛、四物加木栢、補陰丸

氣虛、四君加木栢栢

加味四物湯治諸痿四肢軟弱不能舉動

芎一不熟地三不白芍各七少半五味九枝麥門一不人參半不

栢不連半不知三少杜七少半牛膝三少是不蒼朮一不

右煎空心服酒糊丸服亦可

諸虫

經曰腸胃為市

無物不憂  
無物不包

又曰飲食自倍腸胃乃傷

夫飲食不節則朝損暮傷自傷成積積久成癥  
癥相生而諸般奇形之虫各從五行之氣而化生多滯留中為蠱

類是

外貴秘要 九虫者皆已食人府為

一曰伏虫長四寸諸虫之主

二曰蛔虫長尺許虫生多則貧心即殺之

三曰白虫長四五尺餘母子相生其形轉大而長亦已殺之

四曰肉虫狀若爛杏令人煩滿

五曰肺虫狀若杏仁令人咳嗽

六曰蠅虫狀如蠟蟊令人吐酸逆

七曰弱虫又名膈虫狀如瓜瓣令人多唾

八曰赤虫狀如生肉令人腸鳴

九曰蟻虫狀如茅虫至細微居度腸多則為痔劇則為癰

人亦不必尽有亦不必甚多或偏有或偏無皆已為害

凡此虫依附腸胃之系。元氣尚安。未為大害。稍虛損。已侵蝕。

脉并

脉沈實者。生虛大者死。尺脉沈而滑。寸白虫。

匿蝕陰疰脉。虛少者生。動急者死。

并治例

丹溪曰。濕熱之生虫。藏府虛則侵蝕。

上羊月虫頭向。上易治。已上二月。宜恐並當作。下字。蓋虫無半月一轉頭之理。

先以蜜或砂糖或炒吃。引虫頭向上。然後用殺虫藥。

服內熱。腸胃虛。虫行求食。上唇有瘡口。吞食其。

桃仁湯治上熱下狐。

桃仁 槐子 艾各五升 大棗 五枚 右水煎分二服。

化虫丸治諸虫。

鶴虱。去土拱。練根。東引不出土者。胡粉。炒各。明凡。梧二升半。

右細末糊丸如梧子大。溫漿水入生麻油三四點打勻送下。清米飲。

亦可其虫。細少者。化為水。大者。化為水。

一方黑鉛炒成灰。拱柳末等分。和勻米飲調下。

一方苦棟根。拱柳。鶴虱。三味濃煎湯飲。

一方治蛔虫。酸石榴根。東引者切二升。拱柳。十枚細切。

右二味以水七升煮取二升半。去粗以梗米煮粥。平日空腹食之。

小間虫並見快利神効。

一方治蛔虫。苦練根。生者。東引。刮去外皮。取肉白皮二兩。以水三。

碗煮取一椀半。去粗用晚粳米三合煮粥。空心先以炒肉二片。

吃。以蜜向上然後進粥。一二口少頃又吃一二口。粥上加之。一椀或。

二碗其虫尽下而愈。

麻不

經見寒濕三氣合而為痺。故。寒氣。濕氣。勝者為。痛痺。

又曰。痛者寒多。有寒故痛。不痛不仁者病久入深。榮衛之行。法。經絡時疎故不痛。皮膚不榮故不仁。

夫所謂不仁者或<sup>四肢</sup>自<sup>身</sup>痺<sup>痺</sup>唧唧然麻不<sup>不</sup>知痛痒如繩扎縛初解之狀古方名為麻痺者是也丹溪曰<sup>麻是氣虛</sup>然則曰麻不<sup>不</sup>仁者以不仁中而分為二也

然有虛而感慍麻木兼作

因虛而風寒濕三氣乘之同身掣痛麻木併作治宜先汗後補心

△脉并

脉浮而濡属气虚

脉浮而缓属湿为麻痺

脉紧而浮属寒为痛痺

脉濡而乳属死血為木不知痒痛。

弁例

丹溪曰十指麻木是胃中有濕痰死血三陳加木桃紅加附子行經人參益氣湯治兩手指麻木四肢困怠嗜卧熱傷元氣

茵<sup>二</sup> 炙甘<sup>各半</sup> 升<sup>各半</sup> 五味<sup>世粒</sup> 紫<sup>六</sup> 生甘<sup>各一</sup> 人<sup>各一</sup> 白芍<sup>七</sup>

右細切水煎熱服

孕氣陽治兩腿麻木沈重

茵 二不 升 青 一不 升 紫 歸 稍 沃 各 半 陳 紅 玄 少 許 五 味 世 粒

右細切水煎溫服

補氣湯治皮膚麻木神效

葛陈甘 各二两 沃桑 芍 各八两 右细切水煎温服

三妙丸 治濕熱下流兩脚麻木或如大烙之熱

栢四五切片酒拌炙炒  
蒼朮六五米泔浸二宿細切焙  
牛膝去芦二五

右細末麪糊為丸如梧子大空心塩湯下忌魚腥薑麥麪炒等物

耳病

經曰腎者作強之官技巧出焉  
又曰耳者為腎之外候一曰腎通竅耳  
心通竅舌

夫腎為水藏。天一生水。故有生之初。先生二腎。而一陰藏焉。而又

有相

火存乎命門之中。每挾君火之勢而侮所不勝。經所謂一水不勝二火是矣。或嗜欲無節。勞役過度。腎水枯涸。陰火上升。故耳鳴耳聾。無日不作。或如蟬噪。或如鐘鼓。其甚為可惡。早而不治。漸而至於聾耳。

治法：補南方之火。无有不安者。

脉并：两寸脉浮洪上鱼為溢。

两尺脉短而微或大而數。皆屬陰虛。法當補陰抑陽。

龙寸洪數。心火上炎。

两尺脉洪數。相火上炎。其人必遺精。耳鳴耳聾。

弁治例

丹溪曰：大病後耳聾。宜補陰降火。而加麥柏。

耳鳴宜當歸龍薈丸。飲酒人宜木香枳榔丸。

耳聾以萊菔烏頭尖大姜三味。為末。津調。貼湧泉穴。以火下行。

耳痛以柏欬吹入耳中。効。

諸虫入耳。即死於肉。雞冠血滴入。

大補丸治耳鳴。款龍耳。麥柏一味。不拘多少。細切。酒拌。新瓦上炒褐色。

細末。滴冰丸。如梧子。太每服一百丸。如血虛。以四君子煎湯下。

九耳鳴耳聾。皆是陰虛火動。或補腎丸。或虎潛丸。皆好。

滋陰大補丸

滋腎丸治耳鳴耳聾。栢。溫酒炒。五知母。去毛酒浸。一。桂。半。不。


右細末。煉蜜丸。如梧子。太每服五十丸。溫湯下。

姪強秘方。治耳內忽痛。如有虫奔。或血水出。或乾痛。不可忍。

用蛇蛻燒存性。細研。以鴉翎管吹入耳中。立愈。

眼目

東垣曰：諸脉皆屬於目。經曰：目得血而能視。五藏六府之精氣皆上注於目而為睛。



上属於腦後出於項是故  
瞳子黑眼法於虛  
白眼赤脉法於陽故虛陽含德而為精明  
夫脾者諸陰之首  
目者血脈之宗故

脾虛則五勞七傷精氣皆失所司不巳得明於目矣

心者君火之主神明宜靜而安相火化行其令相火乃包絡之君主百脉皆榮於目既勞役妄動又回邪氣所併而損血脉是故諸病生焉  
醫者若若不先理脾胃及養血去神乃治標不治本是不明至理者

### 脉并

左寸脉洪數心火炎也  
右寸關俱弦洪肝木挾相火之勢而乘侮所不勝之金則已所勝之土

### 弁治例

丹溪曰病屬  
風熱 血少 腎虛  
表當  
散熱 養血

何間日在  
肝 脾  
則為  
裡當  
養血 去神

如暴失明者法繫膜膠淚班入眼皆凡熱宜表散以去之  
如昏弱不欲視物內障見黑者瞳子散皆裡之血少神勞骨

腫子散大皆辛熱所為  
辛主散 熱乘之當降凡熱涼血益血以收耗散之氣

芩連苦寒除邪氣之盛為君

歸身生地養血涼血為臣

五味子酸寒休得收瞳子散太

地骨天门  
厚滋補氣

久病昏暗以熟地歸頭為君羌活防凡甘菊佐之

暴發赤腫以羌活防凡為君以厚連為臣以養血羌活升芷為使

又治血熱癰痛由物湯加龍胆防凡防已羌活

一云安熱上衝眼痛  
連厚太 厚補血

一方治眼痛中島南星羌活為末醋調貼兩足心時牛膝膏洗眼

肥人凡熱上癰眼痛防凡荊芥羌活酒芥水煎服



瘦人目痛血少煎熟用養血藥少加凡藥歸生地玄參芎風荊藜  
水煎服

滋陰地黃丸 熟地二兩 生地五兩 紫參二兩 枳殼地骨連五兩

人參二兩 歸身二兩 茯苓各五兩

右細末煉蜜丸茶清下

春雪膏 赤眼効 朴硝 不拘 置豆腐上蒸化待流下以磁器盛之

依明散治內障

青三少 陳芎 蒼朮 各半 炙甘草 生地 翹紫 各一兩 歸二

右細切煎熟服忌酒醋腥麪辛熱大料之物

當歸於胆湯治眼中白翳

防風 石膏 各二兩 柴胡 羌活 五味子 各三兩 甘酒連 各五兩

酒芩 酒柏 歸酒於胆 酒洗 芍 各七少半

右細切作一服水煎去粗入酒少許煎服

光明丹 治一切風熱上應目赤腫淚痛風弦爛眼及內外翳障等症

白炒青 一兩 黃連半兩 煎熟付鹽去粗用炭火煨炒青石通紅連付身乾者七次

辰一兩 鵬三兩 輕五兩 腦三少 鹿角一少

如赤眼腫痛加乳香沒藥各五兩

內外翳障加珍珠半兩 鴨嘴膽礬二分 熊膽二少

爛弦風眼加銅青半兩 龜丹半兩

或以諸藥摠合為二以治諸般眼疾右各研極細末一處和勻再

研一二日無聲銀瓶盛貯密封口不可令泄氣點眼極妙

丹溪活套

目能遠視 遠視不近 近視 大盛而水虧 也法當 補腎六味地黃丸

不能近視 近視服 地黃丸 是皆手足少陰經心

是以知 不近近視者腎水虧欠也

不遠遠視者心血不足也

是以知 不遠遠視者心血不足也

凡目暴發赤腫用羌防紫芷升酒制苓連甘中生地湯身  
 又暴發赤腫為防凡羌苓為君當歸生地黃連蘆根為臣使  
 日久痛或內障昏暗熟地湯根為君羌防菊荊生甘中為佐使

口舌

經曰中央黃色  
 入通於脾  
 開竅於口  
 故病在舌  
 藏精於脾

夫口舌之為病未有不由七情煩擾五味之傷之所致也

經曰  
 陰之五宮本在五味  
 陰之五宮傷在五味

是以  
 肝熱則口酸  
 心熱則口苦  
 脾熱則口甘  
 肺熱則口辛  
 腎熱則口鹹  
 胃熱則口淡

此外有  
 脾虛不榮肝移熱於膽而口苦  
 脾胃氣弱木乘土位而口酸  
 膀胱移熱於小腸腸熱不便上為口糜瘡爛者

傷寒狐惑  
 上唇生瘡虫食其肉  
 下唇生瘡虫食其肉

其為口之病種不同醫各類推而治之

脈象

經曰  
 左寸洪數心熱甚  
 右寸浮數肺熱辛  
 左關弦數而虛膽虛口苦  
 甚洪而實肝熱口酸  
 右關沈實脾胃有實熱口甘  
 脈虛者中氣不足口瘡涼藥不愈理中湯

全昇治例

脾熱口甘三黃丸

膽熱口苦濕慮不決所致小柴胡加姜門酸寒地骨皮遠志

柴胡地骨皮湯治膀胱移熱於小腸腸熱不便上為口糜瘡爛

胃雍熱水穀不化等証  
右剉煎食後溫服

柴胡地骨皮等

白口瘡  
雄黃輕粉

沒藥乳香右細末搽之

一方治口內瘡明凡

雄黃丹砂雄白梅燒存性各一

人中白煨射香

右細末搽口內甚者加鵬砂半片胆一分

一方細辛黃柏炒各等分為末搽舌上吐涎乃愈

碧雪治口瘡及咽喉腫痛蒲黃青黛鵬砂煨硝生甘草

右等分細末付之或吹之

丹溪治套肝膽實熱口酸苦小柴胡加甘中龍胎青皮

若誤應不誤肝胆虛者人參遠志茯神甘中為君紫胡色勝為使

心熱而口苦或口苦生瘡者生瘡者生瘡心湯涼膈散

肺熱而口苦三姜丸平胃散

腎熱而口鹹滋腎丸大補陰丸滋陰大補丸

類

喉痺

經旦陰一陽結謂之喉痺王注謂

一陰即厥陰胞絡一陽即少陽三焦

四經皆有相火存焉

子和曰油肝和胞都無異

東垣曰火與元氣不兩立二勝則一負蓋元氣虛則相火隨起而

喉痺等暴病作矣

會厭者吸門之司呼吸為人身緊閉之橐籥門之卒腫痛水

漿不入言語不通死在頃刻

會厭之兩傍脫者謂之雙乳蛾易治通謂之喉痺皆相火

所衝逆耳

經曰二水不勝勝二火

又曰一水不勝五火甚言其真水易虧而相火易動

如

房勞則飲食失節則

火起于肝

之類故知痰者痰也

痰者痰也

火之性急速故病發則暴悍治之法必先大瀉其痰或鐵

刺脰

此急則治標之法用茶必以內經從治之法

刺脰

桔梗甘中玄參升麻防風羌活荊芥人參白朮茯苓之類必加干

附子等為嚮導導之類不可傾服此治之大法也

切不可驟服寒茶非徒無益而且促其死耳

俗未諳此理而峻用茶連梔枳之類而正治之

又甚者雜進以大寒中藥傾服但覺腫勢稍退語言畧通而

醫者病者為獲効而喜殊不知抑起陰中寒後坐其毒

乘虛而入脈漸而至於發喘不休不可治矣良可嘆哉

兩寸脈浮洪而溢者喉痺

脈微而伏者死

丹溪曰喉痺多屬痰宜用吐法

又方刺心中燒灰吹入喉

一方治咽喉腫痛 荊芻 桔甘 各等分

右細切煎溫漱而服有熱加姜茶枳殼宜刺少出血立愈

一方治喉乾燥痛 四物湯加桔枳荊知立已

喉台之疾皆屬火熱更有教種之名輕者異乃火之微甚故

微而急者可以緩治 惟用針刺血最為上策

一方治喉痺用膽礬三分吹入喉中吐痰愈

聖煙筒治喉痺草麻子取肉槌碎密撲作筒燒煙吸

病輕者取蟲糞根嚼之更研水於項上付之

一法治喉痺及喉中熱痛好梨杆汁頻飲之患者自嚼吞汁亦

多食為良大解毒准金瘡產婦及諸脫血証不可食以其

破血故之其餘二應癰瘰癧瘻瘻等乃食極妙

齒

經曰百病之起有生於牙者

夫齒者腎之標骨之餘

足陽明胃之脈絡於齒上經惡熱飲而喜寒飲故

其為痛有惡寒惡熱之不同

有開口呻吟則痛甚者腸胃中有風邪

有閉口則穢臭不可近者腸胃中有風邪積熱

大瘞齒新宜露而動搖者腎元虛宜滋陰補腎

憎寒惡熱而口臭穢者胃氣熱宜安胃厚本

脈并凡邪虫蝕証蓋因熱生風而風生虫手腸胃必以擦牙誅虫藥治其標

右寸關洪數或沉而洪腸胃中有風熱齒痛

并治例丹膠口牙疼或出血屬熱胃中有風寒

實熱腫痛調胃養氣如連文用外芷防荊荷甘桔類

灸法上引痛灸足三里在膝下三寸斷骨外大筋內是陽明經各灸七壯

一方燒韭菜子拌煙黃齒數虫死而愈

治走馬牙疳方神効干姜南寒各燒存性枯凡右等分拌付之愈

小兒走馬牙疳床一青府腐爛即死此方神効

擇人尿桶中白垢大煨一不銅綠三分鹿肝一分半付之立愈

獨聖散治一切牙痛凡疳疔等証小地黃蘇蘇陰乾

右為細末每用刷牙以熱漿水漱牙外摩末熱漿水刷牙

大有神効

一方治牙齒痛

黃蠶蜂窠一以川椒填滿其窠更以白鹽一不封口燒存性

白芷一不研末先以清茶漱口後以藥擦之付痛處孔作痛塞之

立愈

妙灸外缺二穴在手太陽肺經與陽明經相連又手取穴中指尽雙

着其浮脈又二間灸七壯痛立止永不復發

鼻經白西方白色入通於肺開竅于鼻

鼻者肺之外候

丹溪曰肺之為勝其位高其體脆性惡寒又惡熱

故好飲熱酒者始則傷于肺勝熱則見於外而為鼻衄准

赤之候得熱愈紅得寒則黑此謂熱極是水之象元則害水絕制

或觸冒風寒始則傷于皮毛而成鼻塞不通之候或為濁涕或流

清涕久而不已名曰鼻淵此為外寒束內熱之証

原病式曰肺熱則出涕是也

膽移熱於腦則為辛頰鼻淵

脉并右寸脉浮洪而數為鼻衄鼻衄

九寸脉浮緩為傷風鼻塞鼻流清涕

奔治例

丹溪曰鼻為肺之竅自肺心上病而不利

寒邪傷及氣不利而鼻塞則表  
麻桂類  
惡風清涕氣不宜通熱則清之  
本連抱之類

而為陽中之陽鼻居面之中一身之血運到面鼻皆為至清至精之血

多酒之人酒氣薰蒸面鼻得酒血為極熱熱血得寒清濁凝結而

不行故色紫黑

宜北降血生新血而物加酒片苓酒紅芍藥冷陳皮甘牛生薑煎

調五靈脂末服氣弱者加酒芍藥

一方用山梔子末蜜丸彈子大空心嚼一丸白湯下

凡鼻塞因乃肺氣盛枯凡研末面脂綿裹塞鼻中教日自消

又方不通細辛附子炮蜜和綿裹塞鼻中

膽移熱於腦則辛頰鼻淵防風通聖散一丸如奇連各二不手煎服

通氣湯治鼻不聞臭香

荳蔻 蒼朮 羌獨 防外 薑 各六分 炙甘草 四分

麻黃 不毒 川椒 白芷 各二分

右細切作一服加薑枣葱白煎溫服忌一切冷物及風寒坐卧

治鼻中時時流臭亥水甚者腦亦時痛各挫腦砂有蜜食腦中

用紫瓜藤近根三五尺許燒存性為末酒調服之即愈

血証

經曰

大怒則形氣絕而血苑於上  
怒則氣逆甚則吐血  
陽明厥逆喘咳身熱善驚衄吐血  
濕淫汗出為軌衄  
脾移熱於肝則為驚衄  
胞移熱于膀胱則癢而溺血  
結陰者便血二升再結二升三結三升  
肝則血痔肝

又曰心即血肝納血

肺即氣腎納血

又曰二息不運則抗滅窮一毫不可續則穿壞判

暴喜傷心則氣緩而心不出血故無所愛

夫暴怒傷肝則氣逆而肝不納血故其血無所收

房勞之妄以致陰火沸騰血從火起故錯經妄行

是以後肺而上溢于鼻者曰衄血  
後胃而上溢于口者曰吐血

夫所謂咳血嗽血者出于肺

其血出于小便曰溺血  
出于大便曰痔血

大抵血後下流者為順易治  
後上溢者為逆難治


丹溪曰鼻出血皆見陽盛陰虛  
血從氣上越出上竅法當補  
陰抑陽氣降則血歸經

又曰諸見血為熱証正經所謂知其要者一言而然不知其要者流  
散無定形此之謂也

脉并經曰脉來如懸鉤為衄脉至而搏血衄身熱者死

腸澼下膿血脉弦絕則死滑大則生溫身熱者死

脉經曰脉得諸淡濡弱為亡血



大陽脉大而得必衄吐血

脉（死）為（失血）  
（少）

脉弦而緊脈痛肝藏傷主有瘀血

吐血唾血脉（滑少弱）者（生）  
（死）

唾血脉（堅強者死）  
（滑濡者生）

### 并治例

丹溪曰口鼻出血皆是陽盛陰虛有衄無涕

衄血涼血行血為主犀角地黄湯入爵金

一方荆芥穗研服或蘿蔔上三段榨汁服又以汁滴入鼻中

衄後宜中葉洗研汁一盞入生薑汁三分之二細嚼之即止大熱衄血

吐血是火熱血上錯經妄行脉大而花（大則衄血）四物加炒梔童便

姜汁

凡血逆行或（吐血）或見血腥氣服薑汁最妙

山梔最忌清胃脫之血

有先吐血後有痰者是陰虛火盛四物湯為主加痰火藥

有暴吐紫血成塊者是熱傷血結于中吐衄為好四物加清熱藥

唾血出于腎天門左門知貝母桔梗遠志地榆或加干姜（鮮血隨言而吐）

咳血痰盛心熱多是血虛青黛葉仁訶子貝母海石梔為末

蜜丸秋盛者加杏仁

舌上无故出血槐花炒末摻之方蒲黃炒焦末付之極妙

大便下血（有熱四物加炒梔升麻秦艽阿膠）

便血用白芷五倍子為丸服効

便血有風邪下陷者蓋風傷肝之生血故宜升提四物加防荊

升紫秦元槐花條苓地榆枳殼煎服

有濕傷血者宜行濕消熱三木連柏厚芩芍地榆槐花煎服

經血逆行吐唾血腥服薑汁

芫花散治咳血成勞 芫花門熟地桔白芍 各一不 甘 半不



右細切煎服

一方治痰草血咳出

木一不半

歸芍牡

各一不

桃

半不

梔

七多半

甘三少生 麦門半不

右細切煎服

治溺血一方、梔子炒黑

右細末水煎連多粗服之

又方小薊根琥珀三味為末煎服蓋二物已指下焦熱結血淋

又方治溺血神効

生地四不三少 小薊根

滑石

通中炒

蒲黃炒

淡丹葉

藕節 當歸

梔子炒黑 甘中炙合七少

右細切煎服

一方治溺血五苓散合四物湯煎服効

凡用血藥不可單行單止又不可純用寒涼藥必加辛溫升藥

如加涼藥用酒煮兩炒之類乃寒因熱用之法

犀角地黃湯治血吐血紅、犀角 赤芍 牡丹 生地各一不

右細切為一服煎食後服

烏梅丸治大便下血如神、 蠶蚕一炙炒 烏梅肉一炙半

右細末醋糊為丸醋湯下空心服

和血散治腸澼濕毒下血

槐心炒 青皮各六 歸身 外麻各一 芎四分 荆地木各六

右細末每服三不米飲調下

枳殼散、 東垣曰

血清而色鮮者腸風心  
血濁而黯者為腸毒  
真前藥為近血  
真後藥為遠血

此藥並皆治之

枳殼十炙 炒黃色 甘草三不炙 右細末每服一不空心米飲酒送下酒煮

芙蓉丸

酒煮芙蓉丸 蓮去頭上五 好酒五升

右芙蓉細切以銀石器盛酒煮連乾為末焙乾末麴糊為丸空心服

枳殼湯治大便腸風下血 枳殼一炙 炒黃色 黃連一炙 炒黃色 黃芩一炙 炒黃色 芍藥一炙 炒黃色 不用

右三味煎食前服

竜骨散。治衄血不止凡九竅出血皆可止也。

竜骨。右一味細研吹入鼻即止。

一方治浮血乾柿餅燒灰存性清米飲酒下三三不立止。

血結骨手不可近。

男婦

中焦高血妄言見鬼昏迷如狂。

皆用桃仁承氣湯。

久病胃脘疼痛蓄血証。

下部蓄血脘下結痛滿硬証用枳實湯。

也。

丹溪活套。

凡諸見血証皆足陽盛陰虛君相二火亢甚前迫其血而諸竅悉宜四物湯加知母黃柏補陰降火之劑為主治。

如衄血咳血。

皆從肺中來本方加同片苓茅芩等以浮肺火。

如吐血。

此從胃中來本方加石膏知母等以浮胃火。

如潮熱咳血。

此血從腎中來本方加溫酒炒梔柏更加白桂以浮腎火。

如溺血於溺竅中出法數成淋作痛或雜尿而痛此從膀胱中來本方加梔子瞿麥牛膝滑石以浮膀胱火。

小便出血不痛此心移熱於小腸故曰血從精竅中出本方加連梔條苓之類以浮本經之火。

如真前血謂之逆血後大腸來。本方加。後視枳實條苓以浮大腸火。真後血謂之遠血後小腸來。不通更炒麥連以浮小腸火。

夫血出於口鼻者或加犀角麥連以清。加第芩藕節棕灰炒蒲黃以清。加韭汁童便山茶花牡丹以清。

其血於大便者或加地榆荊芥白芷茅根以清。梔子側柏條苓以清。

其血於小便者或加瞿麥麥門梔子以清。滑石不通大小蓴根以行。

右當視其新久緩急而施治或山情作。便以四物湯為君主藥。

小便血用呢胎髮如元壯年元病人頭髮剪下為上自落者燒  
灰細研新取側柏葉搗汁調糯米粉打糊為丸自湯或四物湯送下宜  
心妙

一法

大便下血量多者燒存性米糊為丸如梧子大每服八丸空心米飲下  
灸脊中對脐一定血遂止而冬或四物加條芩防前芷槐煎湯  
用橡斗燒灰二不調下右灸某治素年久下血大便下血冬愈  
者其病不再發

### 痔漏

經曰目而飽食筋脉橫解腸澼為痔

附脫肛

又曰

脾胃者倉廩之官五味出焉  
大腸者傳導之官變化出焉

若夫飽食太過則脾氣倦甚不能運化精微朝傷暮損清濁  
混淆故食積下流於大腸之間而為病

蓋脾胃一虛脾氣亦虛而大腸之氣亦從而虛肝不乘脾下流

而為腸風病則皆金失所養木寡于畏之所為耳  
名狀種種不同而其目則同

### 治法

以  
苦寒厚為本連槐槐  
以  
辛溫和血厚芽桃仁  
風邪在下以秦艽防風升麻之類提之  
燥熱拂鬱以大黃枳殼麻仁之類潤之

患此疾者自慎口節欲

### 脉并

沈小安  
浮洪軟弱  
者  
難治

### 并治例

丹溪曰痔病目飛熱燥渴于大腸治血為主大法

用  
本涼大腸  
參連槐地涼血生肌  
當歸和血  
升麻枳殼宣氣腸

漏瘡先以參苓歸朮之大劑補氣血外以附子末和清作餅子  
如錢厚以艾多灸之漏  
大者  
艾炷亦大  
灸令微熱不可令痛餅乾  
即易之再和再灸又以補氣血藥膏貼之

一方治痔瘡腫痛，蝟牛屎乾為末，付之即愈。

洗菜五倍子朴硝桑寄生蓮房煎湯先薰後洗。

一方治痔瘡腫痛不斂，子五倍子俱末調付。

塞菜爐甘石煨淬童尿牡蛎煨共末付之。

又方馬蘭根研細付上片時看肉平去菜稍遲恐肉及出。

秦尤蒼木湯治痔核已破，謂之痔漏，大便秘結必作大痛，此濕熱風燥。

四氣合品為病，故大腸頭成塊者，濕作大痛者，風作大便秘結者，兼受。

火邪其肺金主氣，其体收下赤助病為邪，其効如神。

秦尤去芦 飛仁去皮另研 皂角仁煨香性 蒼不同浸 防風各七 芫柏酒洗

煨身酒洗 沃涅各三 枳櫚另研 太美小許出大便忌食 亦不可多用。

右除枳櫚皂三味另研外，餘藥細切作一服水三盞煎至一盞，三茶。

去粗入上三味，再上火煎至一盞，空心熱服，少時以姜膳壓之，不犯。

胃氣服藥，且忌生冷硬物及酒濕麪大料椒姜等物，犯之無得。

効。如有自膿加白葵五朵去苦心青皮半斤，入煎劑中，小古。

人指此疾以歲月待，降之惟此藥一服即愈。

秦尤當厚湯治痔漏，大便秘結燥疾痛。

大芙煨四不 尤去芦 枳實 沃涅 枳櫚 皂角仁 木各五小 紅沙許 飛去

右細切作一服水三盞煎至一盞，食前服，忌知前。

脫疰漏氣血虛身熱

氣虛參芪升葛

血虛四物湯

外以五倍末托而上之，二次未收至五次必收。

又方以陳壁土泡湯先薰後洗。


又方以龜頭燒存性末，真麻油調付即收。

汗証

經曰心之液為汗，原病或思熱則出，汗。

東垣曰西南坤土之在久則為脾胃，天人之汗猶天地之雨，陰滋其濕，則為霧露為雨。

換內經主於心何心為君火主振蓋脾胃屬土主運濕熱相搏為汗明矣  
 如乾中燒酒非湯火蒸淘則不亡成汗液  
 夫谷勝皆亡今入出汗心主脾胃主濕熱乃握司耳故



盜汗者病似而實不同自汗無時微汗然出動則為其屬陽虛胃氣所司之  
 盜汗寐中通身和格覺未方知屬陰虛寒與主

大抵自汗宜補陽調衛  
盜汗宜補陰降火

大法心虛冷汗自出宜補肝益火以原以消陰翳  
陰虛火炎者當補腎壯水以和以制陽起 醫者詳辨每錯

脉弁如而虛者汗在為自汗  
浮而轉者汗在為盜汗

傷寒脉陰陽俱緊當无汗若自汗者亡陽不止

弁治例

丹溪曰自汗屬陽虛  
盜汗屬陰虛  
疾病亦有汗者

治自汗用參芪少佐以桂枝陽虛者附子亦可用  
 火氣上蒸胃中之濕亦亡作汗凉膈散主之  
 表煎湯治諸虛不足及新病暴虛津液虧冬休常自汗夜則則  
 甚久而不止体瘦心忪驚惕短氣疲倦

牡蛎 芡苢 麻苳根 各一不

右細切作一服入小麦百餘粒煎服

當歸六芩湯盜汗之聖藥

芩一不生地 熟地 栢各七多 芪一不連 苓各七多

右細切作一服煎溫服

正氣湯治盜汗 栢 知母 各一不半 寸 各半不 右煎服

建中湯治自汗盜汗皆効 桂 二不半 芍 一不半 甘 一不 芪 一不

右煎入飴糖煎服

丹溪治法

仲景桂枝湯外感風邪自汗之聖藥

建中湯外感挾氣虛自汗之療劑

東垣補中益氣湯治內傷氣虛自汗之妙劑甚有六脈浮軟而虛

本方加附子以治陽虛其効如鼓應桴

左寸浮洪而自汗者心火炎之本方倍參芪加麥門冬味芩

右尺脈浮弦而自汗者挾風邪之本方加桂芍若不陰虛只桂枝湯

右尺脈洪數而無力而自汗或盜汗相火挾者大勢勢利代脾金本方

加地苓柏只用當歸六味湯

左尺脈浮洪無力而自汗水虧火盛本方加柏熟地壯水之主以制陽光

凡內傷及一切虛損之自汗不休者總用補中益氣湯少加附子麻黃根小表

俱升麻俱用蜜水製炒以

殺升發易悍之性款引參芪等藥至肌表故不可缺

凡上所云皆指內傷虛損自汗故以補中益氣湯為本藥

上湖俟夫得內傷虛汗發熱自汗必雨不止補中益氣十數貼不動尋

以前方每貼蜜制藥一不半參一不半甘草七分湯自芍各一

不升柴各一分加桂三分麻黃根七分浮小麦一握炮附子三錢貼而

汗止熱退而安

瘧病

經曰諸瘧項強皆屬六淫

又曰諸暴強直皆屬於風

原病或曰筋勁強直而不柔知夫肝木屬風而主筋經曰諸暴強

直屬風理宜然之其所謂諸瘧項強而屬於濕有何爭

蓋太陽陰濕甚則兼風化亢則害承運制之

是故知瘧之為病凡為標耳故

仲景有剛柔二瘧之分不可不辨

蓋剛為陽瘧柔為陰瘧

太陽發熱汗惡寒脈弦長脰急背滿口噤手足重急牙甚則搐弱  
角弓反張此為剛瘳

柔瘳

太陽微熱多汗不惡寒脈遲滿弦細而體不復時之搐搦面目合口此為  
風勝者為剛風性剛急故

濕勝者為柔濕性柔和故

此外有諸瘳之候表瘳不狂風寒亦已成瘳是以或

多之証皆能成此疾是乃

瘳為標耳

產後金瘡一切去血也

亦有絕元氣而亦已使入筋脈幸急角弓反張者血脫無以養筋故也

瘳并脈絀曰太陽病發熱其脈沈而細者為瘳

瘳脈來按之舉上然而弦直上下行

瘳家其脈伏堅直上下

瘳病發其汗已其脈微然而蛇暴脈脹大為欲解脈如鼓反

委蛇自得委

并治例

丹溪曰大率五痢相似此痢為瘳切不可作凡治而純用凡藥

多偏氣血虛有火有痰宜補氣血補虛降痰去痰芩芍湯并

栝蒌桂枝湯治太陽傷寒瘳

瀝之類

栝蒌根 甘草各三錢 桂芍 生薑 各三錢 大棗 十二枚

右六味細切作一服水九升煮取三升三服連飲取微汗如汗不出

以熱粥發之

麻黃葛根湯治剛瘳無汗惡寒 麻黃 赤芍 各三錢 葛根 四兩 甘草 半

右細切入葱白三莖煎熱服

桂枝葛根湯治柔瘳有汗不惡寒 桂芍 各二錢 芍 一錢 甘草 一錢 葛根 一

右細切入生薑大棗煎服

防風當歸散治發汗過多發熱頭暈口噤背反張者宜

防風 當歸 芍 生地 各二錢 右剉作一服水煎服

補血湯治一切去血過多面無血色養血助四肢幸急口噤如瘳

如欲歸一不向說 右對作一服煎溫服

如欲風或兼破傷凡者加防風羌活各一不荆芥一不半甘牛半冬

減黃芩一半煎服

信人拳鄉拳敗散新產血虛發瘧汗後中風發熱亦然

荆芥 微炒

右為宋每服三五不外以大豆寒熱酒法去豆寒用酒下効神

丹溪活套音則柔二瘧以虛實論之是也

一屬外感 一屬內傷 外感者 剛瘧宜麻黃葛根湯在裏者大表氣

如以風濕二瘧分剛柔而治恐誤醫者不勝其多今以虛實分

治其理昭然無疑矣 陶氏婦年三十形瘦弱月經後日發瘧白噤服半多張予知其

厥 証曰 陽記 裏按下則 為寒厥

原病或曰 陰厥 者原病脈候皆為 陰証身涼不渴脈微而微

愚按內証所定熱二厥者皆常病虛損証也蓋補之使 陽証煩渴諸症身熱而脈微

正証所謂 壯水之主以鎮陽光 也 益火之源以消陰翳

傷寒論所謂陰陽二厥者水炭殊途治法亦異診察之間死生及掌

脈并脈証曰寸口沈大而滑 沈則為寒 滑則為氣 寒氣相搏血氣入於脈則死

此為卒厥 不知又唇青身冷為入房即死 身溫和汗自出為入腑而後自愈

肺人昏云 陽厥脈滑而沈案 陰厥脈細而沈伏



并治例

丹溪曰厥回氣血虛多氣虛多血虛脉細大和蕊管

熱厥脉教養氣湯

外感脉浮而實解散茶加姜汁

有痰者脉弦白木介瀝

恬人書曰初得病身熱頭痛大便秘小便赤或畏熱或飲水或揚

手擲足煩躁不卧谿谿客憤而厥陽厥大柴胡太養氣湯有白虎

寒熱而厥面色不沃冒脉脉双伏單伏必有正汗多用綿衣包

手足急服五味湯或各半湯瀉更大汗而解

得病後四肢逆冷脉沈細事卧惡寒自面後不渴或下利清

穀陰厥之四逆湯

喘促脉伏而厥五味湯

吐利手足厥冷煩躁吳茱萸湯

五味湯治陽厥脉伏手足逆冷五味參表門舌陳各半

右劉人生姜棗煎服

吳茱萸湯治陰厥吐利手足逆冷煩躁吳茱萸各五參二

右劉入大棗煎服

丹溪活套

熱厥四肢煩熱蓋濕熱鬱于脾土之中用升陽散火湯火鬱湯之類

寒厥手足逆冷多是氣血不足補氣血茶加附子

飲酒今或肥盛人手足熱者濕痰鬱火盛三陳加苓桂

癲狂

經曰

巨陽之厥則腫首頭重足不任行發為癲調小而暴仆其用是

蓋陽氣逆亂故令人卒然暴仆而不知人氣後則甦是癲類

陽明之厥則顛疾欲走呼肢滿不卧面赤而熱妄見言甚則

棄衣而走登高而歌罵詈不避親疏是得陽氣太盛胃

火大腸實熱燥火鬱結于中而為之耳是顛狂

難疑謂重陰者顛重陽者狂多喜為顛然則喜屬心怒屬肝乃二臟相火有餘之証難疑陰陽之

說恐非理

大指

狂為痰火安盛 多為求望高遠不得志者有之  
顛為心血不足 癲為主乎痰自火動之所作也

治

去癲宜平吐 然三証神脫而目瞪如愚痴者  
治狂宜平下 有千金而不止愈

脉并脉大堅疾顛狂

脉虛弦為驚為風癇

脉

沈數為痰熱 沈小急疾者死 虛而弦急者死

丹溪曰顛狂脉 虛易治 安難治

并治例丹溪曰癲大率屬痰必不分五等大法行痰為主

用姜連南星瓜蒌半夏 尋痰 分多少治

有 熱者用涼藥以清心

痰者必用吐吐後用安神及平肝之藥青黛紫胡川芎之類

原病其所論甚精蓋世以重法為顛重陽為狂誤之入際皆然耶  
又見服膏梁旁中石藥則熱記懷悍發為顛狂

此原病其本盡用藥以明顛狂俱是熱

大率多因痰結於心胃間宜開痰鎮心神

神不守舍狂言妄作經年不愈如 心經虛火當清心降火 痰迷心竅當去痰寧心 宜大治之乃愈

龜腦安神丸男女五般顛癲元向遠近發作元時皆治之

夜神 參地骨丹 養門 桑白 各二錢 牙硝 二錢 龜腦 麝香 各三錢

牛黃 五錢 朱砂 二兩半 烏犀角 二錢 金箔 三十五片

右細末煉蜜為丸金箔為衣如風癇 冬月溫水下 夏月涼水下 不拘時

牛黃浸心湯 治心經狂言妄語心神不安

腦子 另研 牛黃 另研 辰砂 另研 各一兩半 大黃 生二兩

右各研為細末和勻再研每服三錢涼生薑蜜水調下

邪祟

經曰 邪氣盛則病 正氣奪則危

夫經所謂邪者凡寒暑濕燥火有餘之淫邪耳非若俗謂鬼神妖怪之

病有心經虛惕如解如知為邪鬼所附

或陽明內寒以致登高而歌棄衣而走 皆痰火之所為安非邪祟所迷也

古史有禁咒一科及童樹咒法之旨皆移精變氣之術但河解疑親  
惑以使心神之<sup>ニ</sup><sub>ニ</sub>正耳何邪崇<sup>ニ</sup>之<sup>ヲ</sup>可祛哉

若夫血氣兩虛痰壅心骨妨礙外障不得運行以致十二官各失其職視聽言動皆為虛妄以邪治之其人必死可不審乎

脉并脉乍疎乍数乍大乍小  
或促或结 皆邪脉之

脉紧而急者遁死

### 弁告例

丹溪曰俗曰衝惡者謂衝并邪惡鬼祟而病之如病此者素有不甘氣血先虧而致者耳

又曰血氣者心之神神既衰則邪因而入理或有之

按此恐指山谷間  
狐魅而言

五邪刺法

肝虛見白  
心虛見黑  
脾虛見青  
肺虛見赤  
腎虛見黃

虎鬼而後暴厥不知其名曰卒死雞股冷自移不寒志脈口中有涎舌不卷卵不縮唇鼻溫未盡一時可信

无洒舌不卷卵不縮唇鼻溫未出一時可信

肝主魂二定肝俞二定  
心陽池二定心俞二定  
脾衝陽二定脾俞二定  
肺合谷二定肺俞二定  
腎京骨二定膽俞二定

以毫針入

得氣補留

三三三三一  
呼呼呼呼呼

條々出針以手  
相定即懸

腎、京骨二穴。膽俞二穴。

秦承祖灸鬼法拍一切驚狂譫妄踰垣上屋罵詈不避親踈等症

以病者兩手大拇指用細麻繩縛定以大艾炷置於其中兩介甲及兩指角肉四處着火二處不着即左動灸七壯神效

還魂丹 治中惡已死 麻黃三五 桂枝二兩 杏仁十二粒

右作一服水煎灌下即醒

蘓合香丸治諸般怪疾

一方治魔死，不還用半支，未吹入鼻中即醒。

恒中 驚悸 健忘

經曰心者君主之官神明出焉夫怔忡驚悸之候或同  
令子虛因而心血為之不足

令子虛曰而心血為之不足

怒氣揚肝  
驚氣入膽

或遇之繁冗慮相充窮則心君爲之不寧故神明不安帝臣仲驚愕  
 之証作之

怔忡者心中惕然動搖而不得安靜無時而作者

驚悸者憂然而跳躍驚動而有欲厥厥之狀有時而作者

若二証俱有清痰積飲滯結於心胞胃口而為之者

又不行固執以為心虛而始醫者自宜以脉証參究其的

脉并寸口脉動而弱動為驚

寸口脉緊跌陽脉浮胃氣則康是以悸

跌陽脉微而浮

浮為胃氣虛微為不食

此恐懼之脉憂迫所致

肝脉動暴有所驚悸

并治例

丹溪曰屬血虛

有慮便執屬虛時作時止有疾目大動

瘦人多是血少

肥人只是痰少

時覺心跳者亦是血虛

怔忡无時

驚悸有時

大法四物湯安神丸之類有疾者用疾藥

定志丸治心氣不足恍惚多忘及怔忡驚悸等証

人參

白茯苓


各三五

遠志去心


石菖蒲

各二五

右細末煉蜜為丸如梧子大辰砂為衣每服五十九食後白湯下




J



恒民粹

地



恒民粹

饌

道三筆

三

A 00  
6483





A08  
6483

顛直追初脊  
上高骨心

孟浪  
夫子以為言莊  
輕率

莊

醫書集成  
卷之四

所獲

三消

便濁遺精

淋閉

秘結

黃疸

中暑

濕証

燥証

火熱

鬱証

瘡瘍

跌撲

金瘡

破傷風

癩凡

恒民粹



BL 10500

三消

鮮白

二陽結謂之消痺成爲消中

東垣云

三陽者陽明也

手足

陽明

大腸主津液若消則目黃口乾乃津液不足也

結者津液不足結而不潤皆燥熱爲病

胃主血若熱則消穀善飢血中伏火不足

此因穀食甘養而多肥故其氣上溢

脾爲消渴

治當以蘭除陳氣

不可服膏粱芳草石茅其

懷得已助燥也

當分三消而治之

高消者

舌上赤裂大渴

引飲

經云

心移熱於肺傳爲膈消

是言

虎加人參湯治之

中消者

善食而瘦

自汗大便堅

小便數

叔和云

口乾飲水多飢虛

庫

成爲消中者是

調胃養氣湯

三芩丸治之

下消者

煩渴引飲

耳輪焦

尿如膏

叔和云

焦煩水易虧此腎消

五味地黃丸治之



麦門冬飲子治心移熱於肺名曰肺消心膈有熱久則引飲為消渴  
麦門一作括知母五味生地人蔘茯苓各半各半

右剉作一服加升葉七片煎溫服

丹澤活本三消者多屬血虛不生津液俱宜四物湯為主

上頤人參之味子黃芩天花散入生藕汁生地黃汁人乳好飲而命生膏  
治中消本方加知母石膏滑石寒水石以降胃也  
下頤黃柏知母熟地五味子以滋腎水

又當飲繅絲湯為上策此皆消白濁及上中三消飢渴不生肌肉効如

神此物大忌浮勝脫次引瀝水上潮于口而不渴也

再養晚蚕其繅絲湯極効如元繅絲湯以鹽殼熟綿煎湯皆

代受

### 便濁

### 遺精

經云諸病及房水液渾濁皆屬於熱

夫便濁之証因脾胃之濕熱下流滲入膀胱故便澀或白而渾濁不清

血虛而熱甚者則為赤濁此心小腸主病屬火故也

丹澤曰大率多量濕熱流注宜燥中宮之濕此皆皆至要之語也

外有遺精滑泄之候与濁相類不可一例而推

夫遺精者多夢見鬼交而世名曰夢遺主熱

亦有思相元形所願不遂而得之者治宜心火神以降火  
相好色太過房勞致虛而得之者治宜滋水養陰以復其陰  
皆十百不易之論

脉并兩尺脉洪數必便濁與精

心脉短小因心虛所致必遺精便濁

女人尺脉洪數而促者皆為便濁白帶

### 弁治例

丹澤云便濁屬濕熱有疾有虛  
白濁屬血由小腸屬火故也  
大率濕痰流注宜燥中宮之濕

肥白人多疾

治宜燥濕降火兼升提三陳湯加二木升柴者如白芍

內傷氣血虛不固守八物湯加減用之

虛勞者用補陰某胃弱者兼用人參及升柴升胃之虛氣

治自胃燥濕痰和肝脉症者以青黛瀉肝木

秘真丸治思想无窮所顧不遂意淫于外房家宗筋肥縱發白

淫白物隨溺而下夢遺白濁骨一兩  
另研 訶子皮 大者 宿砂 手 辰砂 一兩另研以 五枚 兩 分爲衣

### 丹溪活套

赤白淫乃胃中痰積下流滲入膀胱三陳加升柴防以提之

肥白人屬濕熱加二木炒枳或扶苓本方加姜桂

心虛不固守及素虛寒人本方加草薢石菖蒲益智子姜牡蛎龍骨

氣虛  
有本方加 參 芪 朮

血虛  
有本方加 酒 知母 酒炒黃柏

赤白泄小腹痛不可忍宜作寒治用茴香當歸良姜木香苦

### 練紫胡

### 淋閉 附閏拾

經云飲食入胃游溢精氣上輸於脾氣散精上於肺通調水道下輸

膀胱

夫膀胱者主足太陽寒水之化其体有下口而无上口以肺金為肺金

清肅則水道通調而滲泄當於下耳然肺金又藉脾土健旺以資化源

而清氣得以上升而歸於肺以運行也

經云清陽出上竅故清陽不升則濁陰不降而成淋閉之患矣

先哲以滴水之器譬之上竅閉則下竅不泄此理甚明

故東坡多石會定是皆閉上竅之法

原其為病之由皆膏粱之味濕熱之物或燒酒炙肉之類腎道成痰以

致脾土受害乏力不能運化精微清油相混故使肺金无動而水道

不清漸成淋閉之候

或謂用心太過以致心腎不安水火无制清陽不升而感天地不安之  
皆先哲之法言

古方有五淋之別氣砂血膏勞是之

小便淋瀝常有餘瀝不盡  
莖中有砂石而痛溺不得卒出痛止  
溺如膏  
砂淋為病  
過勞勞即發痛引氣衝  
過熱則發甚則溺血

候其鼻準色黃者知其為小便難之

東垣分在氣在血而治之以渴与不渴并之

告寒渴而不飲者熱在上焦氣分肺金主宜淡味茶苓決現灯通  
如車麥藁類以清肺氣導其水以滋水之上源  
不渴而小便不利者熱在下焦血分腎膀胱主宜氣味俱陰茶

知栢之類滋腎丸是之除其熱泄其閉塞以滋膀胱腎水下之  
治淋之法無越於此學者不可不知

脉并

脉

脉証少陰脉數

婦人則陰中生春  
男子則為氣淋

脉細而數

脉盛大而實者生  
虛細而淡者死

并治例 丹溪云五淋皆屬於熱宜解熱利小便出梔之類

不可發汗汗之必便血

老人氣虛淋參朮中黃木通梔子之類

有腎虛極而淋者當補腎精而利小便不可獨用利水藥

有死血作淋者用牛膝膏一云牛膝膏損胃不食宜斟酌用之

老人氣虛而小便不通四物加參芪香附腎丸下焦血乾者死

下焦無血小便澀數而黃用四物加栢知牛膝甘稍

淋法有血通火下焦而滲泄之令不行宜補陰降火四物加知栢物下

滋腎丸

陰虛痛乃厥陰氣滯兼熱用甘中稍蓋欲緩其氣耳

傷寒后脫陽小便不通用生薑汁調茴香末貼小腹上艾炷散用之

滋腎丸治不渴而小便澀熱在下焦血分栢同洗知同洗桂同洗不而服

右為細末丸之空心白湯下服后須兩足令其易下行之

灯一分通二分沃瞿琥各半篇七分苗車前炒苓猪各一

牛膝膏用牛膝一合剉以水五盞煎耗至四入射膏少許空心服

一方治二便不通神効大皂角燒存性右一味煉蜜為丸如梧子大每服下丸白湯

一方治血淋側柏葉藕節車前草各等分石三味同研取真汁調益元散補効

開格人  
格則吐逆不得小便

脉两寸俱盛曰关格其証哕逆而小便不通者是之

人迎太盛倍於氣只名云格  
有格而不關  
氣口太盛倍於人迎名曰關  
有關而不格  
素問

或有人迎氣口俱盛而不便吐逆者揔而言之則按

丹溪曰寒在上而熱在下故多死法當吐以提其氣之積格不必在出痰之用二陳湯探而吐之口中便有降

氣虛不足者用補中益氣湯加枳櫛使清氣升而濁氣降之

一法指吐逆不便急先炙氣海天樞等穴各三壯其吐止然後益利便

一方用藿香平胃散合五苓散加姜枣煎服立効

予長兄修德翁年七十秋園不便通三十余旦百方不效後取地瘠草自然汗服之遂通魚至微之物而有迴生起死之功故錄之

秘結

經云北方黑色入通於腎開竅於二陰藏精於腎

夫腎主五液故腎

|            |            |
|------------|------------|
| 虛則津液竭而大便結燥 | 實則津液足而大便滋潤 |
|------------|------------|

原主所患皆  
飲食失節  
房勞過度  
飲食  
起於  
以致大盛水虧津液不寧

故傳導失常漸成結燥之証



是故有



種不同難一例而推

經云腎惡燥急食辛以潤之

腸結者

大法治燥者潤之以大黃當飯後

服之

尤皂莢之類尤以煉蜜取之

多服補血生津之劑助其真陰庶無再結之患

腸結者

切勿以巴豆牽牛峻劑攻下急暫得通快必致再結愈甚

或有血虛脈大知慈管發熱而大便結燥者慎不妄行

則重亡津

而大便難刺脾約九以下之

脾約者脾經之經絡胃後脾約者津液不潤而結也

丹溪云脾約必准血枯內火熾熱傷元氣故肺受火邪而必竊母氣以

自救夫金耗則土受不傷脾失轉輸肺失傳化宜其大便閉難索使

數而無藏蓄之理宜滋養陰血復陽火不熾金行清化脾土健旺津液入胃大小腸潤而通矣今以此丸

用之熱甚氣室者西北人面赤賦壯實者尤宜不妄

腸愈燥

須知

在西北以附子為主在東南以潤燥為主

學者知更

脉并

脉多沈伏而結

陽結脉沈而數陰結脉沈而遲或結

老人

虛人便結脉雀啄者不治

弁治例

久病脈中有寒熱大便秘不通用潤腸丸微利者不宜用峻利之劑

潤腸湯外

生地熟地各三錢

大黃

酒浸

生寸

桃仁泥

麻仁

各一

紅花

五分

右除三仁別研外餘剉作一服水一盞半入三煎至一盞盡心熱

潤腸丸治脾胃中伏寒大便閉結或乾燥閉塞不食及凡結血閉

桃仁湯泡去 皮署炒 麻仁去壳各 一兩 白朮 大黃酒濕煨 羌活各半兩

右除三仁別研如泥外其餘為細末煉蜜為丸如桐子大每服無定時

凡濕而大便不行加煨皂角仁天黃秦艽以利之  
如脈洪覺身有氣法加大便結加郁李仁大黃以除氣法燥

麻仁 桃仁 飯稍生地 只谷 各等分 右細末煉蜜為丸服

右細末煉蜜為丸服

李邑趙德秀文之母年五十余身瘦得大便秘結燥不食腹痛急診六脉沈伏而結法予作血虛治用四物非仁麻仁大黃等藥未通及加蒲黃導滯九備急園上咽片時即吐出蓋胃氣虛坐食久絕性速之藥耳遂以備急園外以黃蠟包蜜文以細針穿一數孔三九蓋以蠟置有制其不犯胃氣得出齒門達大小腸取効也明日下燥屎一升許縫以四物加減吞潤腸丸如此調理月余而平安

經之入諸濕腫滿皆屬脾土

夫黃疸為病肌肉必虛腫而色黃蓋濕熱鬱積于脾胃之中久而不散故其土色形于面手肌膚也蓋脾主肌肉肺主皮毛母亡令子虛母病子亦病矣是故有諸中者必形諸外耳

肺主皮毛

母亡子孺母病子亦

其証有五曰

魚有五者之分熱元寒熱之異丹溪曰不必分五等是

此外有傷寒熱病陽明內案

故渥然拂鬱內甚皆已

今人多發黃病之

小使非其油也

脉并

脉絳玄凡黃惟寸口脉逆掌无脉口鼻黑色並不治

脉沈渴飲水小便不利者必發黃

酒疸者或無熱靖言了

停者先吐也

穀疸寸口脉微而弱

微則惡寒弱則發熱

計出跌陽脉緩而遲胃氣及強飽則煩滿則發熱客熱消穀食已則飢

穀強肌瘦名曰穀疸陽明病脉遲者食難用飽則發寒熱無頭眩

者必小便難此欲作穀疸也

正之脈滿如鼓

跌陽脉緊而數

緊則為寒食則滿數則為熱則消穀

下流便不通陰被其寒熱流膀胱身體盡黃名曰穀疸

并治例

丹溪曰五芽各濕熱似金龜

輕者小重者大溫中丸熱多加連瀉多者茵陳

五苓散加食積茶

戴氏曰食積者量其虛實下之其餘但利小便使清利則黃自退

或云黃疸用倒倉法

又云黃疸倦怠脾胃不和食少胃苓湯尿赤加滑石

小溫中丸治黃疸多食積又可制肝燥脾之虛者以白朮作湯使

針砂

十兩醋炒七次令通紅另研蒼朮

半斤甘草

五錢神曲

各半斤黃附

斤右細末醋糊為丸食前塩湯下

大溫中丸針砂

十兩如前制陳皮

蒼朮

青皮

厚朴

三稜

醋煮

一方治黃疸

本連桅茵猪以蒼朮

青皮

竜膽

疸病

停者其病難治

不渴者其病易治

發於

陽部

人振寒而發熱

也

諸黃病

但宜利小便

假令脉浮當解

桂枝加芍湯黃芪建中湯可也

脉沈渴飲飲水小便不利者必發黃

酒疸者或無熱靖言了之脈滿欲吐鼻燥其脉浮者先吐沈者先下

穀疸寸口脉微而弱微則惡寒弱則發熱當發不發骨節疼痛當煩不煩而極

計出跌陽脉緩而遲胃氣及強飽則煩滿則發熱客熱消穀食已則飢

穀強肌瘦名曰穀疸陽明病脉遲者食難用飽則發寒熱無頭眩

者當小便難此欲作穀疸無下之脈滿如故

跌陽脉緊而數緊則為寒數則為熱

凡寒相搏食已則眩穀氣不消胃中苦酸

下流便不通陰被其寒熱流膀胱身體尽黃名曰穀疸

并治例

丹溪曰五苓各濕熱似金匱輕者小重者大溫中丸熱多如運濕多有因陳

五苓散如食積者

戴氏曰食積者量其虛實下之其餘但利小便使清利則黃自退

或云黃疸用倒倉法

又云黃疸倦怠脾胃不和食少胃苓湯尿赤加滑石

小溫中丸治黃疸食積又可制肝燥脾虛者以白朮作湯使

針砂十兩醋炒三次令通紅另研蒼朮半斤苦炙神曲各半斤香附一斤

童便浸一宿梔子二兩右細末醋糊為丸食前塩湯下

大溫中丸針砂十兩如前制陳皮蒼朮青皮石厚朴美刺三棧醋煮

我不同上連苦參白朮各五兩生甘二兩李附子一斤童便浸一宿

右細末醋糊為丸二方无連苦參三味之方又无甘李

一方治黃疸本連梔茵猪以蒼朮青皮竜膽

右剉煎服穀疸加縮積莪陳皮神麴

疸病陽者其病難治

發於陰者其人必嘔

諸黃病但宜利小便

假令脉浮當解桂枝加芍湯黃芪建中湯可也

男子黃尿自利當以小便建中湯

黃疸腹滿小便不利而自汗出此為表裏實當止之用大黃芒硝梔枳

黃疸尿色不變欲自利腹滿而喘不可除熱除必噦者宜小半夏湯

酒疸必尿不利其候心中熱足下熱

心中懊憹而煩是其候心中熱欲吐者吐即愈

叔和云額上黑微汗出手足心熱薄暮則發勝脫急求便自利名曰女疸

脈如水狀不治又云黃家日晡所當發熱而又惡寒此為女勞得之腹脫

急小腹痛身黃額上黑足下熱因作黑疸腹脹如木狀大便時澀

此女勞病之非水脹滿者難治小柴胡湯茵陳大黃豆豉葛根白朮

治穀疸柴胡穀芽只實厚朴梔子大黃等分煎服

治腎疸目黃或渾身黃尿赤淡之方

升羌防 芫獨 柴 蒼朮 猪 芎 漢 苓

茵陳茯苓湯治發黃脈沈細數腹冷尿淡煩燥而渴苓桂猪

茵 右剉煎服如脈未出者當飲一不半

茵陳大黃湯治傷寒大發發黃面目俱黃小便赤澀茵陳柴枳芩外

大黃 各七分 竜膽 三分半 右剉煎溫服

梔金丸治黃腫絕妙蒼朮 未付浸 白朮 各三兩 芩 各半 朴 各半 陳皮 一兩半

針砂 醋炒 香附子 各六兩 神麴 炒 麥蘗 麴 炒 各二兩 有塊者裁核 各一兩半

右細末麴糊丸服忌魚麴生冷水果等物

一男年三十余得數疸胃冷湯去桂加茵數十貼黃退首以為安不服

藥十數日後至晚目昏不見物予曰此名雀目蓋濕癰盛而肝火有餘

也用豬猪肝煮熟和夜明砂丸服之自逐明如鼓來謝予曰未也不早

服制肝補脾消痰之劑必則盡脹伊不信半月後腹漸脹痞滿依來

求治仍胃冷湯倍之不效不通者前黃湯下梔金丸二月平矣

中暑

經云

靜而得之為中暑 動而得之為中熱

中暑者陰  
中熱者陽

### 暑熱時

無病人或避暑於深堂大廈得之名云中暑其病必頭痛惡寒身拘急肢節痛煩心肌熱无汗為堂室陰寒所遏周身陽氣不得伸越大順散等熱茶主之  
若行人或農夫於日中勞役得之名云中暑其病必頭痛躁熱惡熱初之肌膚大熱必大渴引飲汗大泄无氣以動乃天熱外傷肺氣蒼木白虎等涼劑主之

### 脉并

經云脉虛身熱得之傷暑

脉<sub>虛而微弱</sub>中<sub>暑</sub>

許學士云傷暑脉弦細孔遲何人經曰寒傷於濕傷於風傷於暑傷於濕而不得形則氣消而脉虛所謂弦細孔遲皆虛脉也仲景以注為作

或脉<sub>虛而微</sub>散

### 并治例

丹溪曰夏月陽氣尽出於地人之脈病屬地氣陽氣於此時降於表脈中之陰虛矣夏月伏陰在內此陰學有虛之義若作陰冷看誤矣

孫真人製生脉散今人夏月服之非虛而何

古人治暑用大順散等劑則非治伏陰之用為禱中記云虛也

戴氏言者有<sub>中</sub>輕重之分

或腹痛水泄者胃中大腸受之惡心者胃口有痰二者胃暑用黃連

香薷而欲連通熱者消暑氣

或身熱頭疼躁亂不寧者或身如針刺者此熱傷在內分之以解毒

白虎等加紫胡氣虛加人參

或咳嗽發寒熱盜汗不止脉微者熱在肺經火氣全在此為中暑用

清肺湯紫胡天水散之類急治則可

清暑益氣湯治長夏濕熱大勝人感之多而服用傷精神短少懶於動

作胃滿氣促肢節煩疼或氣高而短身熱而煩心下痞滿者亦黃芩數

大便頻澀或泄黃如糜或如胡色或渴或不渴不思飲食自汗体重或

汗少者血先虧而氣未病之宜以清燥之劑治之

芪一不蒼朮一不半 升一不參一白不陳皮神麴炒各五小 甘草炙 酒炒

飯青表門干葛各三分 五味子九粒 右剉煎服

黃連香需飲一切暑熱腹痛霍亂吐利煩心等証治之

薑三不 朴姜製 白扁豆炒各一不半 右剉煎溫服

黃連香需飲治証同前前方去豆加黃連七分半之

大煩散有姜炒 右炒 肉桂各等分

右為細末每服二不白湯調下

手半道云大煩散本為胃暑伏熱引飲過多脾胃受濕吐水穀不

分藏府不調所致故姜甘皆經云又肉桂而非桂根蓋溫中藥若仁取

其仁耳若以治靜而得之証吾恐不三解表及增內煩矣

愚按用桂必先歲氣無伐天和其暑月豈可用此熱藥此方自錄于此不

生脉散人參 五味子各等分 右剉水煎服月時以代熱水飲也

孫真人云夏月必服五味子以補五臟氣

東垣云夏月服生脉散加黃甘合久氣力湧出

凡人夏月衝并道途或務農作勞或肥自氣虛之人全不抵當暑熱感  
然昏悶運其氣將絕如在日中即移於陰處徐灑溫湯如未甦急灸  
氣海穴以復元氣醒後以大劑滋補之藥補之切不可灌涼水即死

### 濕証

經云 諸濕腫滿皆屬脾土  
濕勝則濡泄  
地之濕氣感則害入皮肉筋脈

原精云云諸症虛實積飲痞膈中滿霍亂吐下休重跗腫黃如泥按之不

起皆屬於濕

夫濕之為病所感不同有從外感而得之者 有從內傷而得之者

居卑濕之客通途衝并風雨或動作辛苦令汗沾衣之類皆濕從內傷者

差 恣飲酒漿醴醢多食相橘果蔬之類皆濕從內傷者

大抵夏金行使上下分消其濕是其治之心法外濕宜表散 內濕宜淡滲

經云因於濕首如裹濕熱不攘大筋緩短小筋弛長弛長為瘰 弛短為瘰

丹溪釋玄濁者土之濁

氣者為諸陽之會其位高故聰明係係二耳  
濁氣薰蒸清道不通故沈重不利似乎有物蒙之失而不

治濕腎為熱

熱留不下濕傷筋不巳養筋故為拘攣

王冰云素常氣痰濕熱加之氣濕熱爭故為腫邪氣漸盛氣漸微湯

氣裏致邪代正氣不宜通故四維發腫諸陽受氣於四肢位今人  
見膝間關節腫痛全為風治多誤矣

脉并

脉並之濕家為病一身疼發熱而身已似黃黃赤脉浮而緩濕在表也  
或人緩而浮皆風濕相傳之

并治例

丹溪云六氣之中濕熱為病尤居八九

丹溪云

濕在

上宜微汗桂枝湯上甚而微汗以苦溫法以甘辛法汗為動而止不微汗勿發不用  
麻黃葛根湯  
中下宜利小便此法參治濕也

蒼朮治濕上下部都可用

二陳湯和酒本羌活蒼朮不通散凡行濕最妙

防己黃芪湯治風濕脉浮身重汗出惡風或周身疼痛

黃芪三小半甘草一分半防己三小白朮二右剉如姜連煎溫服

濕勝則身重陽微中風則汗出惡風故用黃芪利胃以審寒防己白朮  
以勝濕

喘者加麻黃胃氣不和加芍藥氣上衝加桂下有寒加細辛

加味五苓散治濕勝身痛小便不利伴重發渴本方中加羌活一倍是也

羌活湯治風濕相搏一身疼痛羌七分防風升升五分蒼朮各一

右剉作一服煎溫服

茵陳五苓散治濕熱大勝黃疸發熱五苓散內加茵陳一倍

丹溪治本云曰



膨脹  
腹中

濕本為土氣大熱則已生濕土故夏熱則万物濕潤

夫熱而濕則生濕也因濕生痰故用三陳湯加酒茶羌活防風羌活行濕

大抵治濕宜利小便為上策

若小便自利清自大便泄瀉身痛自汗此為寒濕在表加生附蒼木不為

夫治濕之本為益氣補脾為主亦濕盛氣滿膨脹者以利水行氣為主補

脾藥又未可遽用

或以三不為君以澤通為臣以利水藥為君以參苓為臣

有本而標之者看緩急而施治則方舉方全之功可立而待

### 燥証

經云諸液枯涸乾勁皺揭皆屬於燥

原病其去經云凡熱大則陽火之燥濕少異也然燥金雞屬秋陰而異于

寒濕故又同其凡熱之故火熱勝則金表而風生緣風已勝濕熱已耗便

而及寒陽寒陰虛則凡熱勝于水濕而為燥

凡人凡病多因熱甚而凡燥者為其甚化熱為其主

蓋肝主于筋而凡氣自甚又燥熱加之則筋大燥之燥金主於收斂其

脈緊故為病動強緊急而口噤也

燥熱太甚而脾胃乾涸成消渴

凡熱燥甚脾胃在表而裏氣平者

特善救神名筋脈拘急

凡熱燥甚而胃甚于裏故煩渴而或秘結

凡病發由熱甚而裏凡燥化涎滋而燥從容化

所謂中凡筋緩者因其凡熱勝濕而為燥之甚之然筋緩不收而痿痺故

諸憤鬱病痿皆屬於肺金方燥之化之如秋深燥甚則草木葉落不收

病之象也

是以掌得血而巨桴夫燥之為病有血液衰少至不常養百骸故善是

脈并

脈緊而液或浮而脈

弁治例

丹溪曰皮膚皴揭折裂血出天痛或肌膚燥燥瘡火燥肺金燥甚

宜以四物湯去芍加麥門天花參栢五味子類治之

予仲兄懷德處士年四十五年生体瘦血少庚子歲金太過至秋深燥金用  
夏久晴不雨燥証皮膚折裂手足枯燥搔之屑起血出痛楚十甲身  
及面莫已搔痒予製一方名生血潤膚飲服數十貼其病如脫後治數十  
人皆驗

生地熟地 各二兩 麥門 一兩半 栢五 九粒 片苓 五粒 酒洗五分

括基仁 五分 苑仁 五分 酒紅花 一分 芥 三分

右對作一服煎溫服如大便結加麻仁郁李仁 各一兩

猶察証并因而於三消門秘結門分別某劑則可集

### 火熱

經云諸熱者瘰暴瘡胃眩躁擾狂越罵詈驚駭附腫痰瘕氣逆  
衝上禁懷如喪神守噤吐瘡瘍喉閉耳鳴耳聾溢食不下目昧不  
明暴注咽煩暴病暴死皆属于火 昧 莫達切目不明

三

丹溪云太極動而生陽 陽動而變而生水火木金土各一其性惟火有言

君火人火也言相火天火也火內陰而外陽主乎動者也故凡動皆属火

又星者之性為物所感不能不動謂之動者即內絃之火也

相火易起立性發陽之火相扇則妄動無火起於妄妄化莫測無時

不有煎熱其陰 陰 屬則病 總則死

夫五行之理天人所同知乎此則造化陰陽洞明於宵間又已知其火也

虛實或人補用藥以平之則愈疾之功如射之中鵠矣 以實為作思鵠

脉并 君相之外又有藏府厥陽之火根於五志之內六欲七情激之其火


隨起

脉 浮而洪數為虛火 沉而實太為實火

洪數見於



蓋



男子兩尺洪大者必遺精陰火盛也

并治例

丹溪曰陰虛火動者難治

實火可源黃連解毒之類謂之實者邪氣實也

虛火可補參朮生甘之類謂之虛者正氣虛也

鬱火可發當看其在何經

九火盛者不可驟用寒涼必須溫散

壯氣寒火感顛狂者可用正治硝黃水水之類

人虛火盛狂者以生薑湯之若脈象微者不可投水水也

有補虛則火自降炒柏熟地之類大急甚者必緩之生甘草厚黃連黃芩木亦可

九氣有餘便是火從人肺下起者為火也氣者非真氣五志厥陽之火

動邪氣也

飲酒人發熱者難治不飲酒人因酒發熱者亦難治

輕熱甚重不其此熱在肌表宜清之地骨蒸內未若之類

重熱甚而喘手輕不覺熱此病在肌間之由宜發之升陽散火湯

不通下行導小腸火人自浮肝火尿紅虛火秋石亦是本連浮肝膽太

黃柏加細辛浮勝脫火青黛已浮五藏之謂火玄參已浮无根之遊火

小便降火極連梔子已降從小便中泄去其性已屈曲下行人所不知

大補丸治陰火黃柏去麋甚細切用新右細末糊丸氣虛西君子湯送下

抑青丸治肝火黃連不拘多少右末丸白湯送下

石膏丸浮胃火并食積痰太石膏煨細末醋糊丸清米飲送下

陰虛發熱而物加炒柏酒知母乃降火補陰之妙劑甚者加龜板氣虛加參

羊心熱屬熱當用火黃連或用梔子香附白芷羊心夏月少麴糊丸服

火鬱陽治四肢熱及心煩因熱伏土中或血虛得之或胃虛多食冷

物抑遏陽氣於脾土之中羌升葛芍參柴甘各三分防風藳白

五莖右對作一服煎稍熱服

升陽散火湯治男婦四肢困倦筋骨間熱肌表熱如火燎拍之烙手此病多

血虛而得之或胃虛過食冷物前過陽氣於脾土之中火鬱則發之

升葛独差 白芍 参

各六分

炙甘草

一分

柴胡

三分

防风

三分

生苻

滋肾丸降肾水

栝二兩 栝二兩 栝二兩

栝二兩 栝二兩 栝二兩

栝二兩 栝二兩 栝二兩

栝二兩 栝二兩 栝二兩

栝二兩 栝二兩 栝二兩

栝二兩 栝二兩 栝二兩

栝二兩 栝二兩 栝二兩

栝二兩 栝二兩 栝二兩

栝二兩 栝二兩 栝二兩

栝二兩 栝二兩 栝二兩

右二味气味俱陰以同腎氣故已補腎而浮下焦火也桂枝火邪同故以

寒因熱用凡諸病在下焦皆不渴也右細末丸之白沸湯下

涼膈散大黃 朴硝 甘草

各半 不 不 不

不 不 不

不 不 不

不 不 不

不 不 不

不 不 不

不 不 不

不 不 不

不 不 不

右剉作一服煎去粗入蜜一匙和勻服

三補丸浮三焦火 苓連栝

右末丸服

右末丸服

右末丸服

右末丸服

右末丸服

右末丸服

右末丸服

右末丸服

右末丸服

右末丸服

三黃丸治三焦火盛消渴不生肌肉 大黃連苓

右細末煉蜜丸白湯送下至一月行及奔馬

右細末煉蜜丸白湯送下至一月行及奔馬

右細末煉蜜丸白湯送下至一月行及奔馬

右細末煉蜜丸白湯送下至一月行及奔馬

右細末煉蜜丸白湯送下至一月行及奔馬

右細末煉蜜丸白湯送下至一月行及奔馬

右細末煉蜜丸白湯送下至一月行及奔馬

右細末煉蜜丸白湯送下至一月行及奔馬

右細末煉蜜丸白湯送下至一月行及奔馬

右細末煉蜜丸白湯送下至一月行及奔馬

丹溪活套

去上焦濕熱滴洗苓以浮肺火如肺突熱宜用如虛熱茶則湯肺氣先用

天門冬保定肺氣然后用之

如胸中煩熱用梔子苦寒熱者切當若虛煩補茶為善寒水太寒苓芍苓參

如胸中煩熱用梔子苦寒熱者切當若虛煩補茶為善寒水太寒苓芍苓參

如胸中煩熱用梔子苦寒熱者切當若虛煩補茶為善寒水太寒苓芍苓參

如胸中煩熱用梔子苦寒熱者切當若虛煩補茶為善寒水太寒苓芍苓參

如胸中煩熱用梔子苦寒熱者切當若虛煩補茶為善寒水太寒苓芍苓參

如胸中煩熱用梔子苦寒熱者切當若虛煩補茶為善寒水太寒苓芍苓參

如胸中煩熱用梔子苦寒熱者切當若虛煩補茶為善寒水太寒苓芍苓參

如胸中煩熱用梔子苦寒熱者切當若虛煩補茶為善寒水太寒苓芍苓參

如胸中煩熱用梔子苦寒熱者切當若虛煩補茶為善寒水太寒苓芍苓參

去中焦濕熱身痛以黃連浮心火若中焦突熱宜用若脾胃氣虛不得轉

運乃中焦有鬱熱以苓木苓葛代之

如下焦有濕熱腫痛併膀胱有火邪用酒洗防已黃連栝知之類若白氣

如下焦有濕熱腫痛併膀胱有火邪用酒洗防已黃連栝知之類若白氣

如下焦有濕熱腫痛併膀胱有火邪用酒洗防已黃連栝知之類若白氣

如下焦有濕熱腫痛併膀胱有火邪用酒洗防已黃連栝知之類若白氣

如下焦有濕熱腫痛併膀胱有火邪用酒洗防已黃連栝知之類若白氣

如下焦有濕熱腫痛併膀胱有火邪用酒洗防已黃連栝知之類若白氣

如下焦有濕熱腫痛併膀胱有火邪用酒洗防已黃連栝知之類若白氣

如下焦有濕熱腫痛併膀胱有火邪用酒洗防已黃連栝知之類若白氣

如下焦有濕熱腫痛併膀胱有火邪用酒洗防已黃連栝知之類若白氣

如黑瘦人今焦有濕熱腫痛必用飯紅飛快牛膝等茶

柴胡浮肝火片苓佐之

片苓浮肺火桑白佐之

片苓浮肺火桑白佐之

片苓浮肺火桑白佐之

片苓浮肺火桑白佐之

片苓浮肺火桑白佐之

片苓浮肺火桑白佐之

片苓浮肺火桑白佐之

片苓浮肺火桑白佐之

片苓浮肺火桑白佐之

鼠尾巨浮大腸之火

音連浮心火黃連佐之

音連浮心火黃連佐之

音連浮心火黃連佐之

音連浮心火黃連佐之

音連浮心火黃連佐之

音連浮心火黃連佐之

音連浮心火黃連佐之

音連浮心火黃連佐之

音連浮心火黃連佐之

音連浮心火黃連佐之

白芍浮脾火若冬月必酒浸炒用之

知母黃栝浮腎火并膀胱之火

知母黃栝浮腎火并膀胱之火

知母黃栝浮腎火并膀胱之火

知母黃栝浮腎火并膀胱之火

知母黃栝浮腎火并膀胱之火

知母黃栝浮腎火并膀胱之火

知母黃栝浮腎火并膀胱之火

知母黃栝浮腎火并膀胱之火

知母黃栝浮腎火并膀胱之火

知母黃栝浮腎火并膀胱之火

梔子浮三焦之火在八

下焦連去熱洗去黃漿炒

下焦連去熱洗去黃漿炒

下焦連去熱洗去黃漿炒

下焦連去熱洗去黃漿炒

下焦連去熱洗去黃漿炒

下焦連去熱洗去黃漿炒

下焦連去熱洗去黃漿炒

下焦連去熱洗去黃漿炒

下焦連去熱洗去黃漿炒

下焦連去熱洗去黃漿炒

人中白浮肝火又巨浮三焦火及膀胱之火從小便中出蓋膀胱乃物之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

故道之

一方治陰虛火盛五心煩熱等証人中白

二兩 極清拌炒褐色

生甘黃壹五

右細末每服二不童便調服

駱氏得年四十余夜間發熱早辰退五心煩熱无休半年后求予治其腎  
教伏而且牢浮取全不應予与升陽散火湯四貼而熱減大半胸膈快  
再与三貼熱悉退後四物加知柏水佐以炒干羊脂三十余貼安然

### 附証



吐之令其條連  
行之令其疎散  
下之令其凝滯  
此治五臟身

丹溪先生觸類而長之而又着六腑之証所謂氣血冲和百病不生二有悖  
附諸病生更此發前人所未發者之  
夫六腑者氣濕熱痰血食也  
或七情之抑遏故為九氣悖附之候  
寒熱之交侵

或兩濕之侵法故為留飲濕附之候  
又如熱附而成痰之附而成癰血青而成癰食青而成癰諸此之理也  
又氣附而濕滯之而而成熱之附而成痰之滯而血不行血滯而食不  
消化此六者皆相因而為病者也  
是故治法皆當順氣為先故茶中多用香附撫胃之類至理當要  
者宜知也

### 脉并

脉多沈或結或促或伏



上則見于寸  
中則見于關  
下則見于尺  
左右亦然

### 丹溪有六附之并治

氣鬱 戴氏胃脘 香附 三積行膏臍間必重 蒼木梅芽 蒼木梅芽 氣鬱上行巨散鬱

服痛脉沈 便浸焙乾否則燥



經云諸痛痒瘡瘍皆屬心火

又胃氣梁之變足生大下榮氣不從逆於肉理乃生癰腫

東垣云榮氣即胃氣也蓋胃氣調和則榮衛氣皆順流而無逆

於肉理耳若飲食失節肥甘過傷以致濕熱蘊積于腸胃之間燒

煉府藏煎熬真度此經之所謂陰之五宮傷在五味

經曰熱勝則肉腐是也

法當視其所發之地各從其經而治治於身之表者二十七名

腦發 督脉足太陽經 背 中属腎脉餘皆足太陽

鬚發 手足太陽經 手少陽 頤發 手足陽明

髮發 手足陽明經 腋發 手足陽明經 臂發 手足陽明經

臑發 手足陽明經 乳癰 內陽明外少陽 乳頭足厥陰

膝馬癰 足厥陰 囊癰 足厥陰 喉癰 任脉陽明經

發於腔子之內者四名 臍癰 足太陽 胃脘癰 足陽明經

內疽 肺癰 手太陽經 腸癰 手太陽經 胃脘癰 足陽明經

夫十二經有氣血多少之不同癰疽淺深之有異故治法或

是故 肺癰為宜宜深刺 腸癰為宜宜深刺 臍癰為宜宜深刺

是故 浮露而淺者為癰宜外消 此千古不易之定議也

其証有 善而易治者為癰 惡而難治者為逆

眼白睛黑目緊小 不正飲食納呆而眠食不知味

九 傷痛渴甚 三 脾項轉動不便四肢沉重

聲嘶色脫唇鼻青黑面目四肢浮腫 五 煩躁時咳服痛甚泄利无度尿如淋六

膿血大穢嫩腫尤甚膿水臭莫近七 喘慶氣短恍惚嗜睡八

未潰先黑陷下青唇黑便汚九

逆也又噫氣痞塞喘 咳身冷自汗目眩耳聾

恍惚驚悸錯語皆是 惡証也

疎毒 針烙 外消 補益

五 頌

動息自寧飲食知味  
便利調勻  
神彩精明語声清朗  
三  
頌也  
體氣和平五

凡五頌見三則吉九逆見六則危

脉并

脉数身无热内有癰也 脉无積聚身无热脉数肠中有膿也  
諸浮数當發熱而及洒淅惡寒若有痛處當發癰腫

脉微而遲反發熱

當發癰腫

脉弱而數反振寒

脉浮而數身无热形如瘰癧者中微燥不知痛之所在當發癰腫

脉滑而數

滑則為實滑則主榮衛相達則結為癰熱之所過則為膿

榮衛相達則結為癰熱之所過則為膿

夫腸癰小腹痛按之則痛尿數如淋時時發熱自汗出復惡寒脉

并治例

逆緊者膿未成可下之當有膿洪數者膿已成不可下金黃牡蠣湯主之

丹溪主癰疽因陰陽相滯而生蓋

氣陽也氣行脉外血陰也血行脉內相並周流

寒主凝滯之則凝泣而行遲為不及

熱主火搏之則沸騰而行速為太過

氣得邪而當津液稠粘為痰為飲積久滲入脉中血為之濁此陰滯於陽也

血得邪而當陰道阻滯或溢或結積久滲出脉外氣為之亂此陽滯於陰也  
百病皆由於此又不止於癰疽而已

或問內托之法東垣曰疔間指腫微干外根盤不深形証在表其脉浮病

在皮因非氣盛則必侵于肉急須內托宜復煎散除濕散鬱使胃氣

和平始或末已再煎半料飲之

如大便閉及寒熱少服黃連湯如微利及煩熱已退却再復煎散如此使

榮衛俱行邪氣不亡內傷也

丹溪曰外科精要謂排膿內補十宣散治

未成者速散已成者速潰

誠哉是言若用之於

小瘡者冬月亦可轉重就輕移深居淺潰瘍者夏月濕散依以防風白芷吾恐難衛文



見世人用此不分輕重時令經絡前後正若盲人騎瞎馬半夜臨深池危哉

又云諸經惟少陽厥陰二經生癰疽宜預防之以其多氣少血之血少而難養

久未合必成死証不可不知也處用驅逐利藥以代其後或獨不旋踵

腫癰內外皆虛宜以托裏表散為主如欲用香散者宜戒虛亡之戒

又云癰疽初起多不可使輕淺下馬灸最妙蓋灸火陽達於引毒毒此

從化之意惟頭諸湯會又性宜小而少諸方皆至痛灸至不痛不痛灸

至痛亦有因灸而死者蓋虛甚孤陰將絕脈必浮數而大且不散精神

必短小而昏元以抵當火氣宜其危也

蟻針之法可施於輕小証瘰癧若積毒在藏府者使竭其血於外元益也

外施貼藥亦發表之意精華謂貼於某有神効夫氣得<sub>無則散</sub>何謂神

効貼於某惟輕小瘡毒可

膿出而及癰此虛宜補之凡冷所逼者宜溫養之

疽發深不痛者胃氣大虛必死由多而不知痛也

腫瘍時吐者當作毒氣上攻治之潰後當作陰虛補之若年暮元潰

後發肥不食宜參苓白朮膏<sub>峻補</sub>

癰疽發渴乃血氣兩虛用<sub>生黃芩</sub>以補<sub>或忍冬丸黃芩六一湯皆効</sub>

加味十全大補湯治癰疽潰後補氣血進飲食凡膿血出多陰陽兩

虛此藥有迴生起死之功醫者并經絡時令融類而長之可也或見腫

平痛寬以為安不知省元補養之功愈后虛証復見因而轉為

他病而危劇者多矣

蒲公英化熱毒消腫散結核有奇功已解食毒散淨氣入陽明太

陰經同忍冬藤煎以少酒佐而服之搗爛合鹽之亦妙

◎惡瘡發背癰疽等方方法

外陽益胃散治一切惡瘡發背癰疽等証

羌<sub>一不半</sub>獨<sub>五不</sub>防<sub>五分</sub>防<sub>風稍</sub>半<sub>不</sub>薑<sub>一不半</sub>知<sub>一不</sub>生<sub>地</sub>二<sub>不</sub>苓<sub>一不</sub>

連<sub>半不</sub>栝<sub>半不</sub>鹹<sub>三不</sub>鹹<sub>稍</sub>半<sub>不</sub>翹<sub>三不</sub>參<sub>半不</sub>苓<sub>一不半</sub>生<sub>甘</sub>一<sub>不</sub>

炙<sub>甘</sub>一<sub>不半</sub>陳<sub>皮</sub>半<sub>不</sub>藕<sub>半不</sub>酒<sub>防</sub>已<sub>半不</sub>沃<sub>七不</sub>桔<sub>一不</sub>

右剉分作二服煎入酒數十点臨卧溫服忌飲水

初患二三日者服之立消  
作膿者立潰 隨病上下食前後服

凡瘡皆<sup>陽中之陽</sup>二証而已我治此瘡陽藥七分陰藥三分名曰升陽益

胃散勝十宣之尤人宜之亦名云復煎散或加乳香沒藥尤妙

當飯後活湯治腫痛 芥<sup>酒炒</sup>連<sup>酒炒</sup>各三不 栝<sup>酒炒</sup>沃<sup>酒炒</sup>半不 翹<sup>酒炒</sup>二不

飯身<sup>酒炒</sup>防風 羌活<sup>酒炒</sup>二不 甘草<sup>酒炒</sup>二不 梔<sup>酒炒</sup>一不 獨<sup>酒炒</sup>七不 葉<sup>酒炒</sup>七不

右剉作一服煎入酒一匙再煎食后熱服日三服三日盡六脉俱將

紫清汁調下后共即散 枳<sup>酒炒</sup>散大欬瘡口 兵<sup>酒炒</sup>即 木<sup>酒炒</sup>香<sup>酒炒</sup>各三不 右細末用煎湯調下或

飲瘡口用之決无疼痛以蠟油調塗瘡口生肌飲而甚速平復膏

梁熱瘡所宜用也 人寒地寒暄外來瘡禁不可多用

丹溪治背疽用大黃防風羌活芷芍甘節生地貝母皂角刺黃芩作

大劑煎服氣虛加人參黃芪續後亦宜知也

附骨疽者皆因久得厚味及勞役后酒后涉水得此陽浮於陰之証也

丹溪云環跳穴痛不止防生附骨疽食不為君黃柏青皮及為臣<sup>各加錢投</sup>

休屋者加杜仲牛膝以生升為使作大封煎入姜汁食煎服痛甚有十

數貼效不動加麻黃二貼膝理開氣血通而愈

羌活防已湯治附骨疽初發於太陽厥陰太陰分有 羌<sup>酒炒</sup>芍<sup>酒炒</sup>蒼<sup>酒炒</sup>不

已不香 翹<sup>酒炒</sup>射<sup>酒炒</sup>干<sup>酒炒</sup>白芍<sup>酒炒</sup>通<sup>酒炒</sup>飯<sup>酒炒</sup>尾<sup>酒炒</sup>蘇<sup>酒炒</sup>不<sup>酒炒</sup>甘<sup>酒炒</sup> 各七分

右剉水酒煎食前服姜膳壓之

消毒飲治附骨疽二尤人因寒濕地氣得附骨疽於左腿外側少陽膽經

之穴漏六寸寸緊硬浸腫行失作痛以指按至骨大痛此藥一服即

痛止次日堅軟腫消而愈

連<sup>酒炒</sup>不<sup>酒炒</sup>芥<sup>酒炒</sup>栝<sup>酒炒</sup>藎<sup>酒炒</sup>桔<sup>酒炒</sup>已<sup>酒炒</sup>各半不<sup>酒炒</sup>生地<sup>酒炒</sup>知<sup>酒炒</sup>獨<sup>酒炒</sup>防<sup>酒炒</sup>風<sup>酒炒</sup>飯<sup>酒炒</sup>尾<sup>酒炒</sup>翹<sup>酒炒</sup> 各四分

卷<sup>酒炒</sup>不<sup>酒炒</sup>茵<sup>酒炒</sup>參<sup>酒炒</sup>沢<sup>酒炒</sup>藕<sup>酒炒</sup>木<sup>酒炒</sup> 各二分 甘<sup>酒炒</sup> 陳<sup>酒炒</sup>皮<sup>酒炒</sup> 各三分

右剉作一服煎服

醫癰者醫居小脈之后此陰中之陰道遠位僻處自大腸多血熱氣

運不到血亦平。案中年後尤慮寒之緩有腫痛參之脉証但見虛弱便予滋補血氣可保終吉若元積神之功其禍在結邪之后慎之  
羌活湯治足太陽經中尻臂生癰堅硬腫痛大作左右脉俱緊按之有力 羌活 酒炒各二兩 防風 葉 各一兩 桂 三分 細甘 炙 蒼朮 陳皮 各五錢 右剉作一服煎熟加少酒熱服空心以衣蓋覆癰上使某力行去之

內疽者飲食之火挾七情之火相鬱而發 飲食者陰受之七情者藏府受之 其發在膈下而頭向內手腸胃盲膜以內托之某托出外以針開之而愈先用四物湯加吉更香附生薑煎服膿出后亦用四物湯調理而安  
肺癰 先須發表愈其病咳唾膿血其脉實數或口咳胃中隱痛脉及滑數者為肺癰其脉 緊數者為膿未成 也 先以小青竜湯以解表邪熱后以肺湯吉更湯隨証用之以取膿此治肺癰 終以黃芪湯補裡之陰氣此治潰瘍之例  
浮肺湯治肺癰或肺脹喘促不得卧 葶藶 二兩 炒研末煉蜜丸如彈子大

大棗十枚 右水三盞煎大棗至二盞去其入葶藶九粒并煎至一盞攪勻服之

桔梗湯治肺癰心胸氣壅咳嗽膿血忌神煩咽乾多渴兩脚腫

滿尿赤黃赤 桔梗 各一兩 甘草 炙 各五分 只合 炒五分 甘草 炙 各五分 已五分 甘草 炙 各五分 右剉作一服煎服 大棗 十枚 右水三盞煎大棗至二盞去其入葶藶九粒并煎至一盞攪勻服之

黃芪湯治胸中甲錯隱痛知為肺癰 合歡木皮 一掌 太 右水三盞煎黃芪一盞半分二服

肺癰已破入凡者不治 有吐膿血和肺癰狀口臭他方不應者消凡散入无病男子髮灰清

米飲調下二服而愈

腸癰 當作濕熱積治入凡難治

千金謂腸癰者必殺入其病小腹重按之則痛小使教淋時汗出復惡寒身皮甲錯脉皮急如腫狀脉 洪數已有膿 甚者脉轉側有水

色或 膿自腸出 大便膿血

大黃牡丹湯治腸癰大黃

四分壯二兩

芒硝

三合

瓜蒌子

右剉水六升煎取一升去粗入頓

每煎一沸分三服頓服

有膿即正膿

无膿即下血

乳梗多因乳母不知調養所致蓋人

乳房陽明所結

乳頭厥陰所屬

以致厥陰之氣不行故致閉而乳汁不通陽明之血沸

愈後

鬱悶

厚味

勝故熱甚而化為膿或因所乳之乳有滓瘕

含乳而睡睡時氣喘熱所致而成結核初便惡寒

全須軟吃全消通可散否則結成瘕

或加沒藥青橘葉皂角刺金銀花當

身或湯須以少酒佐之若灸痛然三壯

治法

青皮歸經之藥  
石脂清陽明之熱  
生甘草行胃氣之血  
瓜蒌子順導腫毒

丹溪治乳癰

蒲公英同忍冬藤煎入少酒服即欲睡是其効也

又云乳癰

去膿以青皮瓜蒌桃麴甘橘葉皂角刺甘草節  
已潰以參苓白芍青皮麴甘甘草節

隨証加減煎服

妳岩始有核腫結如鷄子太不痛不痒數年方成瘡初便多服疎氣

行血之藥須情志如意則可愈如成瘡後則如妳之凹膿汁浸

淫胸脇氣切痛用五灰膏金寶膏去其毒與生新肉斷其根

此痰多生於憂鬱積念中平婦人

橘葉散怕婦人百不知意久積憂鬱乳房內有核如鷄子

青皮石膏煨甘草節

各半瓜蒌子一不飯頭五分皂角刺一不半略

炒出汁金銀花五分沒藥

蒲公英各五分

右剉作二服加青橘葉一小握煎加酒食后或卧時服

乳頭破裂或因小兒吹乳血乾自裂開多痛予子一味為末付裂處

如燥唾津調付

有瘰癧者濕熱下注也有作膿者此油氣順下將流入滲道因陰道或

虧水道不利而然膿尽自安不藥可愈在善於調攝耳

丹溪曰治瘰癧教人急由濕熱入肝經起而用補陰藥佐之魚腥

潰皮脫單丸懸掛者皆不效

一方用野紫蘇葉

面青背紅

焙乾細末付之如燥香油調付瘰癧脫衣

者以青荷葉包之其皮自生

。外科集驗 便毒者生於小腹下兩腿合縫之間其毒初發寒熱交作

腿間腫起疼痛是心精氣所出之道路之或人觸景而動心既不得偶合

陰陽又不忘情思愈故精血交滯成腫結初起慎不可用寒涼

藥恐氣血愈結不得宣散及成大患惟當發散寒氣清利熱毒使

精血宣暢則自然愈矣

丹溪曰便毒是厥陰經濕熱因勞倦而發射干三子 同生甘草煎服

利三行効射干紫花者是也紅花者非也

已結成膿者大黃酒拌蒸 刺各五不 只實三不 朴甘草節各二不 桃仁二十

右剉入生薑煎服之

便毒一名騶馬瘡此奇經衝任為病而瘡見於厥陰之分野其經多血

或卒然起核疼痛而發皆熱鬱血聚而成也

。初發宜疎利之即散

療瘰癧丹溪曰瘰癧必起於少陽一經不守禁忌延及陽明天樞食助和手前記

。初發宜疎利之即散

。初發宜疎利之即散

。初發宜疎利之即散

。初發宜疎利之即散

。初發宜疎利之即散

參炒神麩桑椹膏

外學父炙亦漸取効

金室膏去腐朽肉不傷良肉新肉

桑葉灰五碗用沸湯十碗淋汁 穿山甲二兩煨 信硫二不 杏仁七枚去皮同信

生地二兩 辰砂一不 粉霜別研 射香各半不

右將灰汁濃澄鍋煎濃下甲末焦乾一匙下射香次下粉霜乾及九分下

辰砂候成膏下炒石灰末以成塊子收入密器勿見風

紫胡通經湯治小兒項側有核堅而不潰名曰馬刀瘡

紫翹歸精生甘苓 黍粘子 三核 吉各二分 連五分 紅花少許

右剉作一服煎食后熱服忌苦寒泄大便

癰瘤生皮膚頸項面上大者如拳小者如栗或硬或不痛

破結散治石癰金癰氣癰血癰肉癰馬刀癰瘰癧等症

海藻酒洗淨 竜膽草酒洗 海蛤粉通草 貝母去心 昆布酒洗 礬石枯

桑寄生各三 麦麴炒四 半夏麴二 右細末每服二不溫酒食后服

忌鯽魚雞肉五辛生果甘草

凡癰氣先須斷厚味用海藻一兩黃柏二兩為末置掌中時試之以

津唾吞下待消三分之二止

結核丹云凡結核在項在臂在身如腫毒不紅不痛不作膿者多


是痰注不散名曰痰核二陳加酒炒大黃連翹紫柏煎服

一方治臂核作痛用二陳湯加翹芎角刺防風黃芩酒洗 蒼朮煎服

疔瘡石香程氏云疔腫之証皆蓄熱毒之深而成者也近者多見因食

災牛度馬之肉而成此証其形有十三種

夫十三種疔其形狀各不同而其  
所由皆熱毒之甚之治法並急用奪  
命丹雄黃丸下更去其毒銳勢次  
服二活散病勢緩用川經茶



對形施治如无他証有熱即更熱有腫即更腫

如身冷自汗呃逆躁喘狂喝妄語直視者皆毒氣入內不可治矣

疔腫初發時突起如釘故謂之疔久惡心惡寒而肢腫痛二日瘡變為

焦黑色腫大光起根硬刺之不覺痛皆其候也在手足頭面胸背骨節

最急其餘處則可治毒入脈則煩悶恍惚似醉如此者三二日即死矣

拔疔法以黑牯牛牽於石塔上必撒糞候糞上生菌取焙乾為稀黃

牯牛

葉等分為細末先用升筒兩頭去節一頭解十字路將不解頭套在疔上或線緊縛亦筒隔入肉內為度以煎茶末一匙滴水起效於筒內少時葉滾起則疔自拔若一次未効漸加度數其疔必拔也

雄黃丸下疔毒

雄黃 爵金 各一不 巴豆 十四枚 去壳 射香 少許 皂角 全蝎 各一不

右細末滴水為丸如菜豆大每服二十九清茶送下

二消散 羌獨 飯 烏葉 赤芍 金銀花 酒洗 翹 天花粉 甘草節

芒 各四不半 紅花 藕木 荆芥 蟬蛻 葛 各三不 檀二不

右細末每服三不煎蒼耳湯調下

破毒散 信 硃 黃丹 雄黃 乳香 各一不 斑猫 五不 去翅 射香 少許

右為末和麪糊九如菜豆大以銀針開疔頭納藥一丸以茶葉護之

灸法以大蒜爛搗成膏塗瘡四圍番瘡頂以艾炙之艾以藥為度和不

爆稍難愈宜多灸百餘壯元不愈者

諸瘡痛不可忍有

資藥學有用苦寒藥  
血熱人四物湯加苦寒藥  
在下加指  
肥人濕熱宜防凡刺芥芒花凡巨勝濕

治癰瘡用浮萍末一兩蒼耳子蒼木各二兩苦參一兩半黃附二不半

黃芩五不水煎洗之

身上虛痒用四物湯加苓煎調浮萍末一不服

一方治疥瘡及痒人陰蝕瘡添瘡夫火用諸般惡瘡神効

蛇床子 苦參 蕪荑 各二兩 雄黃 半兩 枯凡 二不 硫黃 五不 輕粉 二不

樟腦 二不 大凡子 五不 取肉 川椒 五不 右細末生猪油調付

先哲治癰疽要方備于右宜選用

五香連翹湯治癰疽未成膿者服之可散但當看時令及資藥加

經霜桑葉 燒半燒存性 燒末付湯火 燒瘡

右細末每服三不煎溫服

托裡散 茂飯 金銀花 甘 各等 右剉煎合酒服更詳部傳各加

川經菜充鈔

小五香湯 射<sub>少許</sub>木沈乳藿 翹<sub>各二</sub>右細剉煎溫服

太乙膏治一切癰疽瘡癤貼之神効亦可內服須詳証舟經給作湯

使送下 玄參 芷蘇桂 大黃 赤芍 生地<sub>各二兩</sub>黃丹<sub>二斤</sub>真麻油<sub>二斤</sub>

右細切入油浸夏三冬十春秋七月文火煎黑色去粗入黃丹再熬

以槐柳枝不住手攪滴水中成珠不軟不硬磁器收貯

黃芪六二湯治癰疽發背 芪<sub>六兩蜜炙</sub>甘<sub>二兩炙</sub>右剉煎服

跌撲 金瘡

丹溪曰跌撲損傷

藕木以沽血黃連以降火白木以和中童便煎為砂

在下者可下瘀血但先須補托

在上者可宜飲韭汁或和粥吃 切不可飲冷水蓋血得寒則凝

但一經血入心即死

骨損者用古文錢五分醋浸乳香沒藥各一兩酒研服

丹溪曰凡跌撲傷妙在補氣血

俗工不知惟在運動多用自然銅以接骨然此藥必煨煉方可服新藥

者其火毒與金毒相扇挾香熱藥毒並有接骨之功其燥散之禍

甚於刀劍或定之

治金瘡急以石灰厚傳裹之如瘡深不宜速合者加滑石末付之

又方无灰木皮為末付之

凡打撲損傷腹痛者知有瘀血桃仁氣湯加種木紅花下之

當飯<sub>滯湯</sub>治跌撲損傷瘀滯不行等証

大黃 當飯在<sub>上用頭中用身下用尾</sub>通身痛全用酒浸洗焙

右剉等分每服二兩酒水煎服

雞鳴散治從高墜下不石所壓瘀血凝痛不可忍之推陳致新

大黃<sub>二兩</sub>杏仁<sub>二十一粒去皮尖另研</sub>



右細劉煎入酒雞鳴時服至曉必取下瘀血即愈愚按此用杏仁而不用桃仁者蓋跌打血入氣分故用杏仁以行氣中之血矣

沒藥散治跌撲損傷痛不可忍木炒五兩 飯焙廿次 芒沒一兩半

桂去麋皮乳另研各右末和勻再研每服二不溫酒調下

沒藥散治刀箭傷止血佳痛定粉凡化石灰各一兩 拍礬各二

乳五分 另研沒一字另研右各研細同和勻再研乾搽之

### 破傷風

若夫破傷風証因受擊破皮肉性視為尋常殊不知凡邪乘虛而客章素之漸而變為惡候又諸瘡久不合口凡邪亦已內襲或入用湯洗其湯火之毒氣亦与破傷風邪無異其為一証皆傳蟻經絡燒煉真氣是以寒熱間作甚則口喎目斜身体強直如角弓反張之狀死在旦夕誠可哀

治法同傷寒有在表

在表故不離乎汗下和三法也是故在表者

脉并

表脉浮而有力太陽之脉浮而無力少陽之脉浮而弦小者少陽之中風早陽明宜下若明此三法而治不中病者亦

愚按中風之論詳明矣何其但云三陽而不及於三陰

蓋風邪在於三陽之經便宜祛法早治而愈若得傳入三陰其証已危

或口燥咽乾服備自利皆无可生之証故置而弗論也

右卷邪縮

并治例

丹溪曰破傷風向傷寒壞証看有何經而用本經藥驅逐之誤則殺人同間有法方

河間羌活防風湯治破傷風邪初傳在表

羌防芎藭 各一不 甘地榆 各五分

右剉煎服量緊慢加減用受熱則加大黃一不大使秘加大黃五分緩令通

河間自木防風湯若服前藥太過令自汗者宜服之 木一不防二不茂一不半

右剉作一服煎溫服藏府和面有自汗可用之破傷風藏府秘屎者自汗不止者因服熱藥汗出不休故知無寒之宜速下之入後大芎湯下之

小芎湯 芎二不 苓一不半 可五分 右剉煎溫服

大芎湯 芎一不 羌 苓 大黃 各二不半 右剉煎溫服宜和為度

防風湯治破傷風同傷寒表証未傳入裏服之防羌獨芎 各一不二分

右剉作一服煎溫服

大蜈蚣散 蜈蚣 黃赤足各一條 江漂五不即煎膠炒 九蟠龜 五不炒 冬烟即

右細末每服一不備調下治法依前用裏和至意可服但有裏証不可服次當下之蜈蚣散四不也豆霜半不飲九如某豆太食服一丸漸加至六七九宜利為度內外風去服羌活湯 治一不半在裏之藥也

羌活湯 羌活 獨 防風 地榆 各一不二分

右剉作一服煎溫服若有 痿 加 黃芩 治瘧瘧不重也

若病日久氣血漸虛邪氣入胃全在養血為度

養血湯 飯地芎藭 防風 芒 各一不 細辛 半不 右剉煎服

白朮湯治破傷風大汗不止筋牽肢痛 朮 葛 各二不 升 苓 各一不

芍 四不 甘 半不 右剉作一服煎溫服

祖傳經驗秘方治初破傷風發熱紅腫凡邪將傳經給而未入深者犀角

杏仁 去皮研 羅白麩 各等分 右和勻水調和如膏膏付傷處腫痛熱退

宋末陳因關政肩稜骨被打破得破傷風頭面大腫發熱予與九味羌活

湯服取汗外用杏仁白麩研水調付瘡上腫消熱退而愈後以此法治

影刊人皆驗

# 癰

經云癰者因榮衛熱腐其氣不清故使其鼻柱壞而色敗皮腐

潰風寒客於脉而不名曰癰癰風

原其所由多是熱血得寒所致或及月勞甚而入寒泉及入水聚當是

濕熱鬱于肉而不散風寒客于外而不行內外皆鬱既久而漸成肌

肉之敗腐矣經所謂熱勝則肉腐是也

此証頗重於三陽明之証手足陽明大腸胃脾肺三經之腑也

乃府及於藏病之其熱毒積于中而形於外耳



脉并

脉兩寸浮而緊或浮而洪陽脉浮陰脉實本

脉浮緩者易治沈實者難愈

脉溢者病在上覆者病在下皆為不治之証也

并治例

丹溪曰大風病是受天地間殺物之風古人謂之厉風者以其酷烈暴悍可畏耳

人得之分在上氣血在下血受之則在上在下熱皆不外乎陽明一經

陽明者胃與大腸之元物不憂受治之者須致意看其疙瘩之瘡

瘡在休先見者多在上也下休先見者多在下也

在上者以解仙散取涎血於高縫中下者以通天丹造散取惡物出積於穀道中後用防風通聖散

調之更以三稜針於委中出血

夫上下同得者甚重自非醫者神手病者鉄心守已免

夫從上或從下漸來者皆可治之証

人見其病勢之緩多忽之以法治之全愈不絕味斷慾皆不免再發而終於不救之非惟醫不知亦患是不能禁慾可哀也夫

丹溪治五人矣其不死者惟一婦人因貧无物可食耳余數年後再發其得於本病外又服百金藥加減四物湯半年之上月經行十分安愈

宋洞虛云大凡有五黑色不治余皆可治食

刺狀

自

頭面未為瘰癧

足起者為瘰癧多因感寒熱與痰濕雜氣而成

治法

先以再造散下之以稀粥養半月勿妄動作勞

後以醉仙散中肉利不必怕怯但顯喉頭面腫各不得下旋出惡水或齒縫中出臭水血絲或言不得或悶而死難以飲食只以稀粥用

管灌入或一句或半月二月面漸白而安

醉仙散

胡麻子牛旁子蔓荊子枸杞子四味俱炒紫色

白蔹藥 苦參

瓜萎根 防風 各五兩

右細末每入兩半入輕粉一不拌勻每服一錢茶清調下晨午各

一服后五七日先於牙縫內出臭涎渾身疼痛皆因如醉後利下膿血惡臭屎為効

通天再造散

衛金

半兩 皂角刺

衛生黑大者去尖

大黃 炮合二兩

白牽牛

頭末六分半生半炒

右細末每服五不白未出時以无灰酒調

面東服之當日必利下惡物或臭膿或虫如出口黑色乃是多年

後又進一服无虫積乃止

奇草治惡疾遍身生瘡濃煎洋湯浴浸半日大効此神方也

一方蒼耳葉為君苦參為佐酒浸烏蠍蟲魚代補蛇之或缺研細糊丸

如桐子大每服五六十丸熱茶清送下白三服二月而安

若入紫萍尤捷紫萍多水熬寒月於山沿取之洗去泥略蒸乾用

一法治手指彎曲節間痛甚漸至斬落

春及三日

草麻子去壳

黃連劉知本


各二兩水一升小瓶浸

秋冬五日

取草麻子破平且時面東以浸菜水

服一粒漸加至四五粒微利不妨忌猪魚宜茹淡果獲神効


外科精要為諸瘡立法而不及疔風蓋殘害膚體去死不遠有



深此鮮<sub>免者此之瘡瘍</sub>治法為難乃不言及  
夫八方之風起<sub>因於八方人</sub>  
應其時則物生  
違其時則殺物  
人之稟受有殺氣者則感而受之如持厘受物

翠軒蒼溪叟道長





恒民粹


歸

道三筆

四

A 00  
6483







B110301

經曰二陽之病發心脾有不得隱曲女子不月

其傳為

心

者

經

雞經曰

心出

肝納血

胃納氣

月經和違篇 蓋婦人百病皆息生此五志之火一起則心火亦盛

若夫經閉不通証先因心虛不足由是心血虧耗故之血以歸肝而出

納之用已竭証曰母能令子虛是以脾不磨而食亦少所謂二陽

病發心脾者此也二陽者陽明也因食少故肺金亦失所養而氣滯不行

則無以滋腎陰况月經全藉腎水施化腎水既乏則經血日以乾

涸以致或先淋瀝無時

若不早治漸而至於閉塞不通甚則為癥瘕血膈勞極証不易

治

又如崩漏不止証先因心火亢甚於是血脉泛溢以致肝妄而納

血出納之道遂廢証曰能令母寒是以肝腎之相火挾心火之勢



亦從而相扇所以月水錯經妄行無時而淫溢也

若不早治漸而至崩中不息甚則化為白濁白淫血枯發熱勞

極証不可治矣

經曰

邪氣盛則實所謂

血不足者正氣奪也

丹溪曰夫非此火不主生物人非此火不主有生但貴乎適中

邪氣者相火也

凡動必聽命乎心君則無已上諸証

大抵經閉不行與夫經漏不止其初皆由思慮不足月經不調早

不調治直至危篤求醫愈妙手莫能為矣

東垣

經閉不行有三論學者宜參考以治之不可拘泥也

脉并

脉經曰寸口脉微而瀉微則衛氣不足

衛

衛不足其息短其形躁

血不足其形逆

榮衛俱虛言語謬誤

學衛俱虛言語謬誤

跌陽脉微而瀉

微則胃氣虛瀉則短氣咽燥而口苦

胃氣瀉則失液

少陰脉微而遲

微則血精遲則陰中寒瀉則血不來

此為虛經三月一來

脉微血氣俱虛年少者亡血也三月一來

脉微弱而淡年少得之為無子中年得之為絕產

寸口脉沈而遲

沈則為水遲則為寒

寒水相搏

跌陽脉伏水穀不化

脾氣衰則身腫胃氣衰則身體瘦

寸口脉沈而數

數則為出入則為陽客沈則為入則為陰結

跌陽脉微而弦

微則五胃氣弦則不得息

少陰脉沈而滑

沈則為在裏滑則為在客

沈滑相搏血結胞門其臟

不瀉經絡不通名曰血分

經水前泄後水病

名曰

血分

此病難治

先病承後經斷

名曰

水分

此病易治

婦人帶下六經病脉

浮則為腸鳴腹滿  
數則為腹中痛  
弦則為陰中疼痛生瘡

婦人帶下脉浮惡寒漏下者不治

婦人寸口脉浮而弱浮則為虛浮則短氣  
弱則為血弱則有熱而自汗

少陰脉滑而數者陰中生瘡  
數則氣淋陰中生瘡  
弦者白腸必挺出

浮而動者則人則脫下

婦人崩血下赤白日下血數外脉急疾者死  
遲者生

婦人漏下赤白不正脉小虛滑者生  
大緊實數者死

少陰脉浮而緊緊則疝瘕腹中痛  
浮則亡血惡寒絕產

肥人脉細胞中有寒故令少子其色黃者背上有寒

并治例

丹溪曰經候有



夫經不通或因

墮胎及多產傷血  
久志鬱熱創血  
久發盜汗耗血  
脾胃不和飲食不進而不生血  
刺痰去血  
七情傷心氣停結故血同不行宜調心氣通經熅熅生而經自行矣

虛中有熱月事不來四物加芍

常過期血少也芍歸苓朮兼疾藥

過期紫黑有塊作痛血熱也四物加香附黃連

過期色淡挾二陳加芍歸

常不及期血熱也四物加苓連香附肥人多兼痰治之

血枯經閉者四物加龜紅


附本宮丸服之

肥人軀脂滿經閉者導痰湯如芍歸連芩可服地黃泥痰故也如

用姜炒

肥人少子亦由痰多脂膜闭塞子宮不忌受精而施化宜上某  
瘦人子宮無血精氣不聚亦無子以四物養血養陰等藥  
經水未來臨經將來作疼者血寒也二日瘀血前淨四物  
經水行後作疼者氣血俱虛八物湯和椒煎服  
加香附羌活與  
或各加參苓  
有熱加苓朮

夫血為氣之配因氣而行



今人悉指為風冷用溫熱藥不

調經散治經水或前或後 或 一月兩來 皆可服

歸一不 麥門二不 吳茱萸 枳實 白芍一不 桂 半湯泡七 白芍一不

甘一不 牡一不 桂 半不 阿 炒珠 甘 七少半 右到如生薑煎空心服

和經湯治月經不期不行

歸一不 芎 半不 熟地一不 白芍一不 羌活 紅 三少 香附一不 桂 半不

莪一不 甘 五少 藕木一不 通八少 右到煎空心服

安經湯治月經先期而來 歸一不 半 芎 半不 生地一不

白芍一不 阿膠 炒珠 艾 半不 條芩一不 丹 半不 香附一不

栝 半不 知 半不 連 半炒 右到煎空心服

獨聖丸治月經不通馬鞭中燒存性為丸紅花當歸煎湯送下

四物湯加荊芥條芩止血神効

崩漏多因氣所使而下香附 炒黑 歸身白芍 酒炒各 熟地一不

芎 莖 蒲黃 炒 地榆 人參 各半不 白朮一不 升麻 三少

右煎服甚者棕枳灰末調服

婦人血虛宜用當歸身 肥白人參黃芪同用 瘦黑人參生地香附同用

常下是濕熱 白屈氣 二陳湯加蒼朮治濕為主 氣虛入味 血虛入芍藥

常下是胃中痰積流下滲入膀胱當升 無人知此二陳加二朮升

紫甚者

上用法以提其氣  
下用二陳和二三

仍用元龍子以燥濕痰

肥人常下多是濕痰用海石半夏南星黃柏蒼朮不苦黃附子

冬加干姜瘦人少有此病有者更熱以滑石檉皮川芎海石青礬丸服

帶下必須斷厚味凡用藥寒月少如姜附臨視應變用

一人上有頭風鼻痔  
下有白帶用南星蒼朮酒浸連天川芎姜柏炒檉皮炒丸服

四物湯乃婦人衆疾之樞目也 婦人白帶 乾澀 右等分剉煎服

以上皆丹溪法也

東垣治崩漏常下多主於寒者宜再思之不可一途而論

經曰陰虛陽搏謂之崩觀此可知

東垣曰蒼花

赤者治白者治用之果驗

東垣調經升陽除濕湯治女子漏下惡血月事不調或暴崩不止多

下水漿之物皆因飲食不節勞傷所傷或素有血氣不足心火乘

脾必怠惰嗜卧困倦氣短脾主滋榮周身者脾胃虛而心胞乘之

故漏下月水不調也况脾胃為血氣陰陽之根蒂也

當除濕去熱抑風氣上伸以勝其濕又去火鬱則發之

淨

酒洗 各半

獨

各半

瓜

炙可

升

各一

紫

羌活

各一

蒼朮

各一

右剉作一服水三盞煎至一盞空心

溫服少時以早飯壓之可一服而已止後服參苓白朮湯當歸類

以補之

若遇夏月白帶下脫漏不止此湯一服立止

涼血地黃湯治婦人血崩是腎水虛虛不巨鎮奇胞絡相火故血奔

而崩也

芩薊

各一

枳實

各一

黃芩

各一

細

芍

各一

連

羌

活

各一

紫

草

外風

各三

生地

各半

甘草

各一

紅花

少許

右剉作一服煎空心熱服

柴胡調經湯治經水不正其色鮮紅項筋急腦脊痠痛不安

炙甘草 婦身 薑 各二 獨 薑 升 各半 紫 七卜 羌

蒼朮 各一 紅花 少許 右剉煎空心溫服取微汗止


增味四物湯治婦人血積血瘀 歸芍 白芍 熟地 棗 莢

干漆 炒 各一 桂 右等分剉煎空心溫服

補經固真湯治白帶下流不止其心胞尺脉微細蓋胎前血崩久則身

復亡其陽故白滑之物下流不止所謂崩中日久為白帶之乃本經

血枯指竭津液亡不亡滋養筋骨



白芨花 研 陳 五卜不 生苓 郁李 研 去皮尖 炙甘草 各一

干姜 各二 右剉煎空心熱服少時以早飯壓之

桃仁散治月水不調或淋瀝不斷後復來快如瀉水虛弱少食腹中

堅痛不可行動月水或前或經月不來幸休沈重惟欬眠卧多

思酸物 羌 去皮炒 甘草 半各三 赤芍 生地 各一

澤蘭 牛膝 歸桂 杜參 蒲黃 芍 各七

右剉加生薑煎空心溫服

膠艾湯治勞傷氣血衝任虛損月水過多淋瀝不止 膠 炒珠 芍

甘草 各半 歸 艾 各七 熟地 白芍 各一

右剉作一服煎溫服二方加地榆黃芩

經水過多四物加苓朮

經水淡少四物加莢花紅芍

經水適來適斷或性寒寒熱 先服小柴胡以去寒熱 或以三方併服

單聖丸治經候不調血氣刺痛腹脹頭眩惡心崩漏帶下

香附 研 去皮毛 未醋浸 右細末醋糊丸淡醋湯下

三神圓 治証如前

香附子 一升醋煮

艾葉 四五

婦 二五

右細末醋糊丸服

益母丸治婦人赤白帶下惡露時下不止及治胎前產後及經中諸

般奇病

益母中

五月採陰乾磨細末過鐵

右煉蜜爲丸如酒量便化下氣者不香湯下或細末每服二

或入酒童便調下

丹溪活法云

凡婦人經候不調皆當以四物湯爲主治

如經候過而腹痛綿綿無停屬血虛者方倍婦地

黃氣虛者方加參芪 扶寒加干姜

如經候將來腹中陣痛作止者血氣實者方用羌活黃紅牡

連香附子玄胡之類

如經水常不及期而行者血熱也本方用生地加苓連之類

如經水常過期而未者

瘦人多是血少者方倍當歸熟地加當歸少佐以紅花桃仁泥

爲血虛之類也

肥人多是氣虛按痰阻滯升降然之本方去熟地加參芪甘苓

半橘香附之類

如常過期而紫黑成塊者血熱也多服腹痛者方用生地加香附玄胡

五更連乳沒之類

如過期而血淡色者痰多血少也本方用生薑三兩煎服

如經水通來通斷往來寒熱如瘧者本方合小柴胡煎服

如經行過三五日腹中綿綿起痛者此血行而滯結未盡行本方

加木香檳榔或肥盛婦人或三二個月一行者痰盛而

軀脂閉塞經脈導滯湯加三不消歸香附之類

祖傳經方治婦人室女月經不通漸成脹滿及男子墜馬跌撲損

傷以致瘀血停積致成血盛病者皆治之

飛奴 齒上嫩蕊乾朽不落

雄鼠黃 者足

玄胡 桂

香附

五更 已上二味

砂仁

飛

另研



右等分細末每服三茶匙溫酒調下

一方治血崩不止蒼耳中燒存性好酒調服立止或四物湯調下亦効  
老婦年五十三血崩久不止諸藥不効予以橡斗蒼耳根二物燒  
存性四物加苧蓐茅花煎湯調服其經血自此而止并不行矣

### 胎前篇

經曰陰搏陽別謂之有子

謂陰脈搏手其  
中別有陽脈也

是為血氣和平

陽施而陰化之蓋人夫婦猶天地然天地之道陰陽和而万物育

夫婦之道陰陽和而男女生故欲求嗣者先調婦之經經脈既

調則氣血和平氣血和平則百病不生而樂于有子矣

脉經曰


手少陰脉氣甚者女子之蓋少陰心脉也心主血脉故也  
腎為胎門子入尺中腎脉按之必絕當妊子也

### 又曰婦人妊娠



養之是以諸經脉各養胎日也

若至期當養之經虛矣不調則胎孕為不安甚則下血而墮  
夫手足十二經氣血盈虧不同



安胎之法宜各按月依經視其氣血虛實而調之固元胎隨之患

其或感冒風寒別生異証又宜按法而調治之

枕藥曰治胎產之病當從厥陰之經論之毋犯胃氣及上二焦

謂之三禁不可

汗  
利小便

看

發汗者如傷寒下早之証  
利大便者則脉數已動于脾  
利小便者則內亡津液胃中枯燥


制方之法，不犯三禁則榮衛自和而寒熱止矣。皆醫者之繩墨。其妊婦早當絕去嗜欲安養胎元。

性宜靜而不宜躁 休宜動而不宜著 味宜涼而不宜熱 衣宜溫而不宜寒 婦久立久行久勞

忌一切肥甘煎燂油膩辛辣鹹酸水果魚蟹鴛鴦鴿雀一類即無胎漏胎痛胎動下血子腫子痛等症及接產逆生胎死腹中之患矣。

丹溪曰：難產之婦，皆是八九月內不忌謹欲以致氣血虛故也。

傳曰：古者婦人妊子



夜則令婦誦詩道正立則生子形容端正才力又古人所謂胎教也。妊婦可不慎歟。

夫人欲求嗣必先視其婦之經脉調否。如未調必以藥調之。經脉既調，宜以人參助之。按其法而行，庶不失常。其候之訣云：

三十時中兩日半，二十允君須等。落紅滿地是佳期。金水之時空霍亂。

霍亂之時枉費工。樹頭樹底不見發，但解開花能結子。何愁丹桂成叢。

此蓋月經方絕，金水絕生。此時子宮正開，乃受精結胎之候。各太細之時也。此佳期則子宮開而不受胎矣。然男女之分各有要妙存焉。

要妙存焉

月候方絕



過此則不孕矣

若

陽精 陰血 先 至陽精後衝氣氣未來血開未精虛外陽內象陽而為男 入陰血後衝氣未助精開未血虛內陽外象陰而為女

術法

以鉄斧一柄置於妊婦床席之下勿令人見知更佩雄雉一二兩於妊婦身左或佩置亦可

三法皆疎不可輕忽

傳曰不孝有三無後為大

古詩曰皇官一身輕有子方是足

誠哉是言也無嗣者宜深思之無怠

脉弁

脉經曰婦人三部脉浮沈正等按之無絕者妊娠也

婦妊初時寸微小呼吸五至至三月而尺數也

脉滑疾重以手按之散者胎已三月也

脉重手按之不散但疾不滑者五月也

妊娠四月脉

左疾為男 右疾為女 俱疾為生二子

又

左手沈實為男 右手浮大為女 左右俱浮大懷生二女

又法尺脉

左偏大為男 右偏大為女 左右尺俱太生二男

大者如實狀

婦人懷娠脉青經而浮按腹痛引腰脊為欲生也

又法婦人欲生其脉青經半夜覺痛日中即生也

妊六七月脉

沈細者死 實大牢弦弦緊者生

弁治例

丹溪曰婦人血者多由血少不足損精

俗醫悉謂子宮虛冷投以手熱某某煎熱為府血氣沸騰不能墮

或服艾者不知艾性至熱

艾火灸則下行 多服則致毒

各持誰執

瘦怯

子宮乾冷宜滋陰養血血物加香附黃芩之類

肥盛

婦人 軀脂滿溢則塞子宮宜行淫燥痰中漸漸消風寒去或之類

墮胎乃血氣虛損不能榮養胎元而自墮耳

按胎則果落也 氣衰則自墮也

又曰

怒傷情乃火使動赤白墮胎猶人折其技

大能銷物造化自然

病源乃謂風冷傷於子藏未得病情者也

作疾各如懸 顏色變

一婦有胎即墮其脉尤大無力重取則瀋乃血少也以其妙年身  
補中氣使血自榮濃煎白朮湯調苓末一服未至三四兩  
得保全而生

安胎飲孕成後胎氣不安或腹微痛或腰間作疼或飲食不進  
宜服或至五六月常服數貼甚好 白朮 歸 白芍 熟地  
各一 參 芎 條苓 陳 各半 甘 縮 紫蘊 各三

右劉作一服加生薑煎服

安胎丸 白朮 條苓 神曲 炒各等分 右細末丸服清米湯下蓋

本苓乃安胎之聖也俗以苓為寒而不用及謂溫熱藥能  
養胎殊不知胎孕宜清熱養血循經而不妄行乃已養胎  
苓必取細細沈寔者用之

縮砂安胎以其止痛行氣故也 非八九個月內 至宜多用

胎動者自火逼動胎逆上作喘急用條苓香附之類

胎漏滑有胎而漏下也屬氣虛有熱四物加膠珠香附 炒黑

本苓縮入糯米白水煮

又方治胎漏下血 條苓 白朮 一兩 縮砂 膠 炒成珠 各三不

右細末文湯調服

心腹諸痛凡妊婦偶有所傷腹痛不安或後高墜下重物所壓  
觸動胎元痛不可忍及下血者甚妙 砂仁 玉珀多少 研

和皮畧炒去皮取仁為末熱酒調服不飲酒者未飲艾湯 煨  
湯皆可如覺胎中熱其胎即安

凡妊娠三個月忽心腹疼痛不安用 歸 膠 炒二 寸 炙二

葱白 四不

右為劉煎服

妊娠四五月忽心腹疼痛 大棗 十四个炒全黑 塩 一不燒令赤

右為宋一撮許酒調服

妊娠心腹大痛氣欲絕者 芎 歸 苓 朴 各兩 右劉煎溫服

治妊娠腰脚腫痛 苓 朮 姜 甘 各一 杏 三不煮皮研

右劉煎溫服

胎腫謂有胎或手足浮腫者是也屬濕多施于二合炒末米湯調下丸亦可

惡阻乃有孕而惡心阻其飲食者是也通身多後疾治三陳類

一方以木九服 一曰肥人是瘕

參橘散治妊娠三月內惡阻吐逆不食或心虛煩悶 橘紅 苓 各一

麥門 白朮 朴 姜制 寸各各 右劉入生薑煮溫服或加卷一不

子煩妊娠苦煩悶不安又曰心煩熱悶謂之子煩 麥門 苓 瓜

知各一 右劉煎入女瀝服

犀角散治子煩 犀角 地骨 條芩 麥門 苓 各一

甘 右劉作一服煎入女瀝服

澤瀉散治妊娠氣雍身倦腹脹浮腫喘急氣促尿不利謂之子滿

沢桑 穀 穀炒 枳 通 苓 各各各 右劉加生薑煎溫服

木通散治妊娠身倦浮腫四肢脹急尿不利謂之子腫

通 桑 香茅 紫蘊 莖葉 各一 木香 訶 各三 枳壳 炒 枳

條芩 各半斤 右劉入生薑煎溫服

白朮散治妊婦面目虛浮肢體腫脹名曰子腫 朮 二兩 生薑皮

大腹 陳皮 苓 各半 右為末每服二升米飲調下

橘葉方用茯苓多桑白朮

紫蘊散治胎氣不和腰上心腹脹滿疼痛謂之子懸 大腹 芎

白芍 陳皮 紫蘊 湯 各六分 冬 甘 各三分

右劉加生薑三片葱白五葉煎服

安胎散治妊娠小便澀少遂成淋瀝謂之子淋 麥門 通中

滑 歸 灯 甘 各五斤 人 芎 各一兩

右細末每服二升麥門湯調下恐滑石太重而滑胎若暗見

可用六七月已前不可輕用若此時胎動不安最穩

麥子散治子淋小腹疼痛胎動不安 冬 麥 炒 紫 桑

赤茯苓 赤芍 歸 各等 右劉加生薑葱白煎溫服

防已散治妊娠中風口噤四肢強直角弓反張 防已 五斤

羌活 一兩半

右細末別用黑豆二合炒焦黑投好酒中

沸定去豆調藥末攤開口灌之稍醒再灌有効

天門冬飲妊娠外感風寒久嗽不已滑之子嗽治之

紫苑茸

知母 洗去毛

桑葉 各一兩

五味子

桔梗 各半

右剉作一服煎嗽血者加阿膠半兩

百合散治妊娠咳嗽心煩不食

百合

紫苑茸

麥門

桔梗

桑葉 各一兩

杏仁 各一兩

右剉煎入蜜半匙再煎三沸溫服

丹溪參不飲治妊胎胞四物加參木半幅時 右加生薑煎服

丹溪曰轉胞之証胎婦

憂鬱 食味厚

者庸有之

古方皆用滑利藥鮮有應効 思胞為胎所壓轉在一邊胞系

轉底不通耳胎若拳起居於其中胞系自疎水道自利

吳宅寵人患之兩手脉似濡重按似弦无稍和早已得之憂鬱為

血少氣多則胎氣弱而不毛拳 弦為有飲血少則胎弱氣多

陰 其書功隨

有飲中焦不清而陰則胞知所避而就下乃以上藥與服隨

指探喉中吐出藥汁惟少頃氣定又與之次早亦然至八點

安後治教人亦効

寄生散治妊下血不止胎動不安

桑寄生 婦續斷 芎

香附 膠炒

茯神 白朮

人 各半兩

右剉作一服加生薑煎溫服

羚羊角散治妊娠中氣頭項強直筋脉事急語洪痰壅或發搐

不省人事謂之少癇

羚羊

獨

酸棗

炒

五加 各八分

薤風 芎 茯神 杏 各四兩

木香 各二兩

右剉加生薑煎服

芎藭散治妊娠外感風寒渾身壯熱頭目眩運

藎 芎

白芍 朮

麥門

陳葛

各六

甘草 各三

右剉加生薑煎溫服

妊娠傷寒有節疼痛甚不急治即落胎 紫葛 石膏 各六

大青 八分

梔 一分

外 八分

葱白 十四莖

右剉煎服

傷寒安胎

白木芙蓉 各等分 炒上炒金書

右劉加生姜煎服

治妊娘傷寒

柴一不 前 歸 治七人 芍 生地 各六

甘三

右劉加生姜煎服

治妊娘咳嗽

紫苑

麥門 各一

桑白

杏

炒去皮研

甘二

桔 焙三

右劉加生姜煎服

治妊娘嗽見紅

歸 熟地

天門

麥門

紫苑

桑白

各半 炙

杏 各半

桔 片 苓 五味

阿膠

炒各二

右劉煎服

治兒在腹中叫哭用多年空屋下鼠穴中土二塊令妊婦嚼之

即心

又方用黃連三五不壞煎汁時時下自止

丹溪來胎丸至七八月內服之

苓 炒一兩枚

木 二

苓 七不

陳 三兩不見火

右為細末丸白湯下

臨月用以養胎方

歸 芍 苓 陳 木

香附

各一

芷 半

不 廿二

催生散

芷 炒焦

百中霜

白滑石

各小

右細末

歸 煎湯調下

紅 芩 及 馬 齒 莧 俱 忌 隨 胎 妊 婦 忌 臨 產 用 以 催 生 煮 食 効

雞 產

多是氣血虧

亦有氣血凝滯而不忌指置者

亦有因九月月不忌謹者

雞

雞 產 多 見 於

安 逸 富 貴 奉 養 婦 人

其貧賤者未之有也

古方瘦胎飲本為湖陽公主設蓋以其奉養厚而氣實故

以之耗其氣非至論也

如神散治雞產用巴豆三枚草麻子七枚 各去殼 研入麝香少許

櫻作餅子貼臍

詩曰

巴三連七脫衣裳

細研如泥入麝香 櫻作彈丸臍下貼 便更子母使分張

催生如聖散用黃蜀葵子炒細末每服二不熱酒調下或湯亦可

或以蜀葵花焙乾酒調下二不亦効

詩曰 黃葵子炒百餘粒 研爛酒調濟君急

若還臨危雞產時 免得全家俱哭泣

奪金丹治胞衣不下蓋兒初生惡血流入衣中衣為血脹故不下須臾衝上逼心即死急服此藥  
黑附子炮半 牡一兩  
干漆二兩半研妙 右細末用米醋一升大黃末一兩同煮成膏和煎藥末為丸如桐子大每服五七丸溫酒下

一方治胞衣不下 牛膝二兩 歸一兩 通三滑 四不滑

黃葵子二兩 右煎連進救服立下

自妊娠初得以至臨月藥石禁忌歌

玩斑水蛭及蠱虫 烏頭附子五天雄 野葛水銀并巴豆 牛膝薤菜連蜈蚣  
三稜代赭芫花麝 太戟蛇蛻菱雄雞 牙硝芒硝牡丹桂 槐花牽牛皂角同  
半夏南星互通中 瞿麥干姜蟹甲凡 硃砂干漆兼桃仁 地膽茅根莫用好

飲食禁忌

雞肉合糯米食令子生寸白

鮎鯉同雞子食令子生疳能瘡

食羊肝令子多厄難

食鰾肉令子項短縮頸

鴨子子桑椹同食令子倒生心寒

雀肉同豆醬食令子生雀卵班忌

食姜子令子多指

食雀肉飲酒令子多淫元胎

豆醬合蒼菜食清胎

食諸般菌生子驚風而太

勿妄服湯藥

勿心飲酒將

心有大驚子必癲痴

勿勞力過傷使腎氣不足子必解顛不合衣太溫

食母太飽若脾胃不和常衝虛損子必羸瘦多病或或

臨產須知

一 臨月不可洗頭以免橫生逆產

一 懷妊十月已滿陰陽氣足急然臍肢陣痛胎子偏陷臍間重



脈穀道挺道漿水淋下其兒遂生此乃正產若當生自有時如瓜熟蒂落自然落之類

一 凡臨產宜於年高有識穩婆及純謹婦人三四人扶持二應外來閑雜之人喪服穢濁之婦預宜杜絕勿令觸犯胎氣致產不利產後客氣犯兒亦主傷害

一 凡臨產房中不得喧鬧宜緊閉門戶靜以待生

一 月歲滿足方覺腹痛不可驚動太早則舉家產亂卜筮問神立現之流稱說鬼神多方惑亂利產婦聞之恐怖大恐則氣怯氣怯則上焦閉下焦脹氣乃不行以致難產如犯之急宜服紫羅散以寬其氣

一 臨月忽然腹痛或作或止或一日二日胎水已來腹痛不緊名曰早痛

一 一月前忽然腹痛如欲便產却又不產者名曰試月

一 非同胎水未至不來便不妨更但當寬心候時若果當產時腰腹痛極不已穀道挺道眼中火出其時便產豈有或痛

一 不痛欲產不產之候耶人多於此胡行亂做枉了性命不可慎哉

一 凡初覺腹痛而腰不甚痛者未產也且技行熟思若行不得則使物而急行得又行

一 世人不識但見腹痛便作便謂生產坐婆踈狂者不候時至便言試水試水併胞漿先破入產戶以致產門狹小腫脹乾淡難產

一 將產之時產母甚痛不肯舒伸行動固執曲腰眠臥胎元傳動尋到生門已被遮閉又轉又尋再三胎已元力次至難產

一 產母初覺欲生便惜力調養不可妄用力兜方轉便用力一逼令兒錯路以致橫逆必待到產門用力一逼即生此所當用力也譬如登三層時候未至用力何益

一 凡產母如覺心中憤悶白蜜一匙溫水調服

一 產母如覺欲進軟白粥不令飢渴以致乏力亦不可食硬飯之類未產之先或煩渴飲飲水只可五清米飲

一 凡不可服催生待水况血得寒即凝血一凝則胎滯而致難產夫催生待法是野道古求食利之設有仁益哉

一 凡產婦胞漿未下但當穩步無妨胞漿既破一二時後不生便當服催生藥要緊夫胞漿者本胞內養兒之水也兒既折胞其水既下胎隨水而下則為易生胎元無力傳頭遲慢將下即血未開塞道路令子無路可通故難產如用蜀葵子等破血之藥遂去惡血兒得路而生故曰催生藥也

### 允催生

一 多用滑利迅速之藥如虎腦筆頭尿腎牙蛇涎之類是也  
二 若見水血先下子通乾法不生下者如豬脂油蜜酒葱麥子牛乳榆皮類  
三 若暫停勞力之久瓜落至虛入子宮氣血凝滯而難產牛膝  
四 筋犯惡氣心煩燥悶難產者麝辰砂乳香青丹如之類  
夫產育之難者皆由產婦不曾預聞講說生育道理臨產倉惶用力失宜遂有難產之危

### 是故有

近產者則  
孩生者則  
坐產者則

### 先露其

足  
手  
臂

此皆用力太早之過

當胎脈疼痛之初兒身繞將而未預用力一逼遂致撲逆若手足先露者用細針刺兒手足二分深三四刺以驅逆其上輕上送入兒得痛聲將一俯即順生之矣或兒脚先下急以溫塗兒脚底又可急撥之併以溫摩母腹上則正生矣  
冬法治難產及胞衣不下急於產母右脚小指尖頭灸三壯壯如黍大五壯  
一方治橫逆不順子死腹中用伏龍肝細末一二小盞酒調下其兒頭戴至而出甚效電心之紅土

### 礙

礙產兒身已順門戶俱正兒已露頂而不生此因兒身四將肚帶攀住兒肩不任下治法急令產母仰卧輕推兒向上徐引手以中指按兒肩下其臍帶順候兒身正頂產母用力一送兒

兒即下生

凡兒身向未順生路未正產母用力一逼令兒偏生或左腿或右

腿或臂或左右額角嬰兒身已逼產門而不正下但兒已露頂非頂也 治法令產母仰卧看生人耗推兒近上以

手正其頭用力一逼即下

若又頭後骨偏扭較道兒則露額看生人以綿衣灸令溫畏手急於較道外傍輕推兒頭令正然後用力一送兒即下生

治盤腸產法

臨產則子腸先出甚可驚恐治法以盆盛溫

水溫潤其腸令產母仰卧且以言語安慰其心却用好米醋半盞和粉汲水七匙急喂產母面或背則打頓而收每

一喂令一縮三喂三縮腸則尽收矣用參蔞歸芎等大劑加升柴以類以外奉之未有不安者也

又法急以草麻子去殼研細貼產母顙頂上即收

二方治產難數日子死腹中不出母氣欲絕

瞿六兩

通

桂各三

膝四兩

榆皮四兩

右剉用水九升煎取三升分三服

傾飲即下二方無論皮有毛花粉四兩

一方治子死腹中不出用黃牯牛尿不拘多少陰母腹上立出

一云以牛屎炒令大熱入醋半盞裹青布於母臍上下尉令立下

丹溪活套

凡婦人胎前諸疾只須以四物湯為主治看証加減調治

如腹中煩悶口苦厭食不問月數多少者加木香條芩縮

如五六月後胎動不安或逆搶逼心者加枳殼縮木香殼苳

根金銀

如五六月前無故下血或因夏下血增漏胎者加苓朮

時芷茅根地榆桑寄

如七八月前後面目及四肢浮腫者加苓朮苓朮炒梔枳實

如感冒風寒頭痛發熱或体痛者加小柴胡或更加細辛

風羌等藥

如三個月內嘔吐惡心不納飲食謂之惡阻本方去地加陳半縮

木藿麥芽神麴或時有白濁白帶本方加荅陳牡蛎骨半末如無故腹痛厚利清水或發熱胎動不安本方加木荅猪

沃訶縮麴姜類

。祖傳經方治難產滯漿胞乾胎不得下用香油蜂蜜各一碗和勻用銅鈹慢火煎一二沸掠去沫稠白滑石末一兩重攪勻傾服外以油蜜於母臍胸上下摩之立產

### 。產後篇

經旦息不運則概減窮一毫不續則穿壞判所謂氣血周流循環無端少有不續則身危矣

。若夫妊娠婦子在腹中母子一氣流通全賴漿水滋養十月教足血氣完全秋神俱備忽如多骨自能用手折胞求路而出既出胞外母子分懸呼吸殊息

。夫胎元壯健者胞既折即隨漿而下故易產也其困弱者轉頭遲慢胞漿既乾汚血未塞道路凝滯是以橫

生逆產子死腹中產母之命死在頃刻可不畏乎

。見將生之際胞漿既下踰時尚未分娩當當撈捏設計用某逐去惡血使子路通暢而無難產之患豈可袖手以待斃哉是故催生之策即芎歸益母冬葵之類皆使之逐去汚血者若腰腹未甚痛漿水少淋瀝而下名為試將來矣非胞內真漿也宜宜寬心守候切不可輕易使冷穩梁接取產母用力逼

胎太早多致接逆不順切須謹慎

。其或先見手足不順者額偏露者但當以手輕之撥正以待其自下可也

。若分免之後胞衣未下者痛為可懼宜多方用藥逐下甚不可令粗率婦摘取常見有擗破尿管致絡身之害者有取下肝葉而產母隨時殞命者可不謹乎若夫難產之婦皆是產前惡飲所致非難產且產後諸疾皆由是而生焉或有乍寒乍熱似瘧非瘧或大

熱頭疼、身痛、如傷寒狀、或卒中、口噤、如瘧、如癰、或左癱、右瘓、角弓反張、或妄言、見鬼、心神惶惑、耳目口鼻、如覺黑氣、如烟薰之狀、或腋中作痛、綿綿不絕。

已上諸証、若非惡露未盡、即是勞傷、血氣大虛、証、  
丹溪曰、凡產前、當清熱養血為主。

產後宜大補氣血、為要、患有雜証、未治、此万世易、  
確論也。

雖然

離襁太早、或澡浴身垢、感胃風濕、  
雞子松、難消之物。

皆已惡寒、發

熱、變証多端、醫者宜潛心診察、脈候、以扶危極急、不可苟且、  
妄治、以夭折人、天年也。

脈并

脈証曰、新產婦人有三病、

一者病瘧、  
二者病鬱胃、  
三者大便難、

師曰、主津液、胃燥故大便難、產婦鬱胃、其脈微弱、不食、  
食大便反堅、但頭汗出、所以然者、血虛而厥、而必冒、家欲、  
解、必大汗出、以血虛下厥、孤陽上出、故但頭汗出、所以產婦喜、  
汗出者、亡陰血虛、陽氣独盛、故當汗出、陰陽乃復、所以便、  
堅者、不食也、小柴胡主之、病解、已食七八日而更發熱、  
者、此為胃熱氣安、養氣湯主之。

婦人產後七八日、無太陽証、小腹堅痛、此為惡露不盡、五六日不、  
大便、跌陽脈微實、再倍其人、發熱、自晡煩躁、譫言不食、  
利、即愈、宜養氣湯、熱在裏結在膀胱、

按

丹溪曰

產後宜大補氣血為主、患有雜証、未治、

叔和以仲景治傷寒法、用養氣小柴胡等藥、欲退產後之熱、

恐非至當、可法、始述於此、與賢者共議、而採挾之、可也、

丹溪曰

產前脈細小、  
產後脈洪數、皆死。

又曰產前脉當洪數既產而洪數如故豈得不死此亦大藥言  
令見產後豈无脉洪數而生者

### 并治例

。母後曰產後當大補氣血為主。集有雜証以未治。

。產後補虛用參朮芪陳歸芎各月如發熱。恒則如茯苓漢參重則如干姜

或云大熱而用干姜何也。由此熱非有餘之邪熱乃陰虛生內熱耳。

蓋于姜已入肺利肺氣又已入肝引象某生血然必與補

陰藥同用。此造化之妙非天下之至神其孰能與於此哉。

。產後發熱惡寒或口眼歪斜等証皆因血氣虛甚當以大補氣血為主。

左 手脉不足 補血氣多於補氣氣

右 手脉不足 補氣氣多於補血氣

切不可用小續命表散之劑。

。產後惡寒發熱腹痛者當去惡血若脈不滿者非惡血。

惡露不盡小腹作痛名兒枕痛用五厘脂香附為末醋糊丸甚者。

加留尖。赤行木陳煎湯下氣虛者四君子湯下。

。治血刺痛用當歸乃和血之法。

若因積血而刺痛者宜赤行木。血在上潴頭類血在下潴尾

。產後血暈用韭葉細切盛於有嘴瓶中以滾醋浸急封瓶口。

以瓶嘴納產婦鼻中即甦。

又用秤槌及磚石燒紅投醋中重熨良法也。

血運自氣血俱虛痰火上升作暈三陳導痰隨氣血加減。

砂安神丸。冬湯下則衆所安神丸。三辰生地飯時少食

。清魂散治產後血運昏不知人。澤蘭 冬 荊芥

甘草 芎 右細末每服二不溫酒入童便調下。

更用漆器燒烟薰之頻置醋炭更服此藥。

。愈風湯治產後中風口噤牙關緊急手足癱瘓弓反張。荊芥

歸 右細末每服三不立淋酒調下童便亦可。豆淋酒

大黑豆炒焦投酒中。

。新產後不可用多藥以其酸寒之伐發生之氣也。

。產後乳汁不通用通中木通瞿麥桔梗芒硝麴甘天花素皮煎細飲之更摩乳房。

。產後泄瀉用陳木苓芍酒芍苓滑石炙甘草煎服立効一方不用有暈按二物皆不可缺。

。凡乳母水短少即是病生須服葉調治蓋兒飲母乳母安兒安防患未然治之善也。

。有產婦自收生者不謹損破尿管而致淋瀝不禁自肌肉破尚可補其脉虛甚寒者為君芍婦為臣羌活蒼朮為佐大劑煎之極飢飲之二月而安蓋氣血踈長其將即完恐稍遲亦難成功也。

。參歸散治產後去血過多血虛則陰虛陰虛生內熱令人心煩短氣自汗頭痛熟地歸身參桂麥門白芍炒各一不右細切作一服入水葉生薑煎服。

。三仙湯治產後失血過多腰痛身熱自汗歸身三莖二白芍

炒一不半右剉作一服加生薑煎溫服

。三聖散治兒枕痛歸桂玄胡各等分右細末每服二不

或溫酒調下

。益肌湯治產後虛汗不止莖二不木瓜熟地牡蛎煨枳

白苓麥門冬炙甘草各半不右剉加大棗煎服

。濟陰湯治產後陰虛發熱或日間了寒發寒熱

歸芍生地紫各等分右剉煎溫服

。調經散治產後虛弱血虛虛弱積府流注肌肉腐壞成水令人面目四肢浮腫功不可用辱水泄利之藥是謂重虛其虛多致大亡此藥主之沒一不琥一不桂芍歸各一細

射香半不另研右細末薑汁溫酒童便和調服

。正脾散治產後通身浮腫及治婦人太病後脾氣虛弱中滿腹脹等病莖炮香附童便浸苗甘草陳

右等分細末每服二不灯中不通湯調服

凡五不

右細末湯荷湯調下

細一不

旋覆花湯治產後感冒風寒咳嗽痰壅坐卧不安前

麻黃 杏 五味 茯苓 甘草 旋半 荊 赤芍

右等分加生姜大棗煎溫服

養血丸治產後惡血不散發熱腹痛及惡露不尽脘腹堅脹

治婦女經候不調赤白帶下腹痛疼痛 歸赤芍 各四兩

杜桂 延胡 炒各二兩

右細末煉蜜丸如梧子太每服三十九或溫酒任下

治產後陰脫留陰戶子宮脫下 飯 荳 白芍 各二不

外半不 右對煎溫服未取再服

婦人乳汁不通有三種有

血氣壅盛乳脈滯而不行者  
血氣虛弱乳汁絕少者

夫

虛者補之鍾乳豬蹄鯽魚之類  
盛者行之通中偏苦土瓜根之類

毋誤活套

新產一旬不可用生芍藥以其酸寒能伐發生之氣以黃

芩四物湯為補虛之要藥以醫易為是也

如氣虛者本方加參苓時發熱加干姜

自汗多者用蜜倍蜜炙黃芩勿用淡苓

如口渴加五味麥門

如腹痛者非芍藥不可至新產亦可用但酒炒

惡露不盡作痛由物湯煎調香附五灵脂末服甚者加赤仁泥

新產子宮未斂作痛名（兜攔痛）醋炒芍藥栗殼煎

水煎入少米醋服或三物為末醋湯調服酸以收之


產後有惡血不去發寒熱成癥瘕者四物加積殼乳沒赤紅

五灵香附干漆之類



產後腹痛不息四物加烏某香附陳桂良姜童便和醋煎服  
產後月餘經血淋漓不止四物加芷外調血余炭服  
產後陰痛四物加藁本防風  
產後通身浮腫四物和乳沒桂通大腹良姜血竭枳櫛  
產後子腸不收八物加升風瀉以酒炒姜炭為君  
產後中風白眼歪斜八物加附子荊芥少加風龜煎服

聖濟卷之五十五



恒民粹

兒

道三自筆

五

A 00  
6483



急驚

利發牙疼  
宜風凡凡  
宜風凡凡  
宜風凡凡

慢驚

發白水陽  
發白水陽  
發白水陽

丹痧白

急驚

丹地  
丹地  
丹地

辰事  
辰事  
辰事

小兒

常聞小方脉科古人謂之

蓋嬰之流

蓋嬰之流

蓋嬰之流

蓋嬰之流

抑且藏府

抑且藏府

抑且藏府

抑且藏府

夫孺子之在襁褓中也

夫孺子之在襁褓中也

夫孺子之在襁褓中也

夫孺子之在襁褓中也

8110902

抑者其証

抑者其証

抑者其証

抑者其証

夫小兒之在胎也

夫小兒之在胎也

夫小兒之在胎也

夫小兒之在胎也

其為母者

其為母者

其為母者

其為母者

400  
6483  
輕率





頭門 腫起定為風山損

鼻內黑燥渴難禁面黑唇青令憂存 肚大青筋便惡候  
更煩腹有直身紋

◎急慢驚風并

証曰諸風皆屬肝木 夫小兒八歲已前純陽 蓋其真水未

旺心火已炎故肺金受剋而元氣平不故 肝木常有餘令

父母失於保養 飲食飽飽 肝木受風 故急慢驚風之候作矣

夫慢驚風屬 肝木虛弱 治宜 和中甘溫 補心之劑

急驚之候自聞不常 或助馬食飲之 噤口致面青口紫或戶

身熱面赤引飲白鼻中氣熱二便赤燥 不睡

蓋熱甚則生痰 盛則生風 傷驚而發耳

宜用 天竺黃 犀角 桑寄生 黑豆 白芍 右研末 湯送下

慢驚之証多因飲食不節 損傷脾胃 致吐瀉日久 中氣大虛 故

驚搐發則應休止時 其身冷而黃不渴 白鼻中氣寒 三便青白

蓋脾虛則生風 盛則筋急 俗名天吊 凡者即此候

宜用 參朮湯 參 朮 白朮 茯苓 白芍 甘草 右煎食後服

白不發 參朮湯 參 朮 白朮 茯苓 白芍 甘草 右煎食後服

錢氏謂 慢驚 為 無陽之証 心經受熱

天麻 小兒急慢驚風 其虛寒者 寒熱和天麻 治之 者 十死生

醫不謂此理 誤為一途 而治誤人多矣



丹溪只 授驚養脾 朱子煎湯 下黃神丸  
急驚養血 降火清痰 歸地白芍

梔子 大黃 青黛等丸服用之

益黃散治風不旺右關脉洪太亨中熱腦度熱或寒水肅乘脾土

嘔吐腦痛浮刺青白赤佳

生時多可令速去

右煎服

安神丸治邪熱驚悸心忪面黃頰赤壯熱

門冬 牙硝 荳蔻 山茱 寒水石 吳甘 辰砂 龍一

右細末煉蜜爲丸砂糖水化下慢驚用參苓煎湯化下

手足白不徹治積痛和胃生津止浮渴煩厚利將成慢驚者服之  
人下木香 白朮 甘遂 藜蘆 各一名 黃芩二名

人不吝畧甘炙藿各一名葛二承

右煎服丹瀝和山茱白烏真

殺撫弁



寅卯辰時潮熱自上升手足動搖口流涎涎筋急此肝不太旺當

新肝 澤青丸 主之 藥

巳午未時熱心神驚悸目上視白睛赤才閉緊急營流汗足動

猶此心太旺也。當

中而戌時潮熱極而喘自微斜視眩則露睛足手冷夫使下重生

補脾、益氣散

行肝、保青先、得芳登、食養及、正榮方

亥子丑時朝撼不堪痛而卧不穩身無土氣自情紫汗見矣

有度大便艱暢色乳食不消多生小瘡補脾養血文

口中氣熱呵欠頻頻手足麻木發散也

身很多嘔多味或吐，不食，痛當先定痛，選用白餅子後

地黃丸治肝腎虛

熟地 山萸 山茱 伏丹 白茯苓 各 右細末蜜丸熱水化下

導赤散治心熱

生干地木通可右等分細切入淡升麻服一方有美子  
白餅子治小兒腹中有蟲但飲乳嗽而生瘡

滑石 輕粉 半衣 湯泡七次 南星 一名 巴豆 二十一斤 去其膜  
右研巴豆後入衆藥末以飯為丸 薄切湯下 水壺

◎ 五癩奇

凡小兒胸皆當隨脈治之如  
鐘病身跳及折手俱難之時也

特療和戶吐法獲呼實  
羊癩自體吐舌半吐心

立痼重者死病後甚者亦死治法並同立色丸

右煉蜜丸。每子太。服三四丸。寧。奇。易。下。

◎諸疳

飲食肥令人肉滿

穀食可食中風

乳餅ニラヒキ

四立歲獲提數元父也不能訓指務姑息

五寶愛遠益食肥甘五瓜果生於津成積膠目致身

鐵口咒病（多因大傷後或吐瀉後氣血下注）致脾胃虛損土津涸而成說持一

耳未可慮以為然其所謂大病吐浮豈非飲食之所致乎

若瘡在  
則  
面頰赤身熱安神丸  
伴黃腫大紅食泥土蓋黃散  
主之

氣喘口鼻生瘡、蓋夏散  
極瘦身生瘡疥地黃丸

協  
病則  
喜升令也也美是

內(廣則) 自體虛弱，色衰氣微，舌白，瘦弱，此陰証之木喜也。

木香丸治瘦冷瘕

木香 青栳肉豆 各二升 射香 一石 續隨 一石

蝦蟇

大者三寸 燒石性

右細末煉蜜丸如梧子湯下

胡黃連丸治肥熱痢

胡黃連

黃連 各半兩

辰砂

二兩半 別研

黃芩

射香

各一少

右細末和勻飯丸如麻子大每飲下方用蝦蟇半兩焙

乾不燒

白粉散治瘡

烏賊骨末

七二

白芨末

三二

輕粉

一已

右和勻先用清漿水洗瘡拭乾付之

如聖丸治冷熱痢

史君

二兩

胡黃連

黃連

黃芩

各二兩

射香

半斤

干蝦蟇

五斤 酒煮度青

右細末以藥膏和丸如麻子大入葱湯服

一方治疳積腹太

胡黃連

去疳積

阿魏

各五斤

射香

各二斤

黃連

炒去熱積酒漬

神曲

炒去食積

各二斤

右細末飯丸如麻子大白湯送下一方有芦荟半斤

◎吐瀉并

經曰諸嘔吐酸暴注下迫皆屬於熱

又曰濕勝則濡泄

夫嘔吐泄皆由乳食不化傳化失常

蓋食將則成熱食將則酸而

又曰食積則胃不和

食積則胃不和

木瓜丸治小兒初生下吐瀉甚

木瓜末 木香末 射香末 輕粉 枳末 各一少

右每研勻起糊為丸如黍米大每服三二丸甘中湯送下

初生三日內吐瀉甚不思乳食大便乳食不消或白色者是傷食

下之而後和胃下白餅子和胃益黃散

初生三日已上至十日吐瀉身不熱者熱者涼不思乳食大便青白乳

食不消益黃散

五月二十五日以後吐瀉身無熱者乃房中十分中九分熱也或

因傷熱乳食吐乳不消瀉深黃色 玉露散主之 石香

寒水石

各半兩

生甘草

二兩

右細末溫水調下

六月十五日以後

大暑

吐瀉身熱似熱非熱

瀉黃白色似瀉食前少服

若美飲食後服

吐瀉身熱

五苓散倍白朮和蒼朮

七月七日以後

吐瀉身熱

七月七日以後

立秋後

吐瀉身熱

暗瘡白多噴玉瀉食前多服

若美飲食後少服

玉瀉散

八月十五日以後

秋分後

吐瀉身熱

吐瀉

世黃傷熱乳

也皆當下白餅子主之

治小兒腹脹

蘿蔔子 紫菀梗

干薑

陳皮

各等分

甘草

少許

右細末切水煎服食少者加不

腹痛治例

飲食所傷

陳青

木神曲

麥芽

有

藥

加

藥

大便酸臭積甚白餅子

虫瘕面皸

口中淡而沫自出

發痛有時兒不怯胃寒故出動而

心腹痛之綱略相似但

和玉瀉

耳安出散主之

黃粉

炒黃色

枳

練子

鶴虱

各等分

白凡

二兩

右細末溫水飲下臨睡時服

一方以練根向東南生者出王者利去麋鹿取白皮細切漂煎汁

先食糖蜜或炒肉引虫頭向上然後服藥汁量兒大小与之

夜啼心經

有藥

治之用人參

黃連

各等分

甘草

少

桑葉

右細切生薑煎服

一方灯花

三錢

以乳汁調抹乳上食兒吮之

痰熱胃熱

用二陳

加升葛

白芍

人參

五味子

加

生薑

一方用胡荽連

枳陳雷丸

神曲

半支

史若

右細末

相和

白湯下

解額

頭健不

同母氣虛

五散多

錢氏曰生下而顛不合腎氣未成也至長必少笑

更有目白睛多而眇白色瘦者多愁少喜當合四物有熱

加酒炒黃連煎服更以常服米及以白欬末付之

③小兒吃乳胃氣熱也用石膏陳茶末煎服

脫肛用東壁土泡湯先熏後洗

一方用五倍末付而預托入之

④小兒赤痢俗名赤痢蓋熱毒氣客於腸理搏於血氣凝於皮外赤智

苓連麝香煎湯入芒硝泡洗而後生肌不通前芥為末

羌仁煎服之

一方用白堊即白土寒水石各五錢右細末末醋調付

⑤小兒胸中汗出伴痛用枯礬乾付

一方用栝末付之

⑥癰頭用通聖散滴拌厚大黃到圓煎炒共為末再以酒拌煆乾毒服

一不煎服外以炭燒紅入水中煮熱洗之更以胡安子肉

龜肝懸龜尾其色白為末油調付之

一方松樹厚皮燒存性三兩黃丹二兩礬末黃連末各五錢

粉二不共末熱香油調付

⑦小兒疳積俗名疳積做餅令香焙微緊時上盧古俗名勿用冷菜及下

之少以浮芡散徐服有渴者非熱也脾胃中津液少也不可

下若大病後弄古者必

瀉黃散黃芩槐二不石膏半斤甘草七寸防風四寸

⑧龜背乃肺熱脹滿攻於背膈即成龜背又乳母多食五辛熱

物亦成此証宜浮白散加黃茶

瀉白散桑白皮蜜水半升炒地骨一斤加茶一右煎服

⑨龜背兒生下客風入脊連於背膈即成龜背治之以龜尿點

骨節即平取龜尿法用蓮葉置龜於上尿自出

◎重舌本舌乃舌下生舌也

用三稜針於舌下紫脈刺之出血即愈

一方女溼銅箔黃末付舌上

◎小兒口瘡 爛梅 紅赤 連枝燒 龍丹 金白 龍胆 許共細磨

白屑滿舌及兩腮名口瘡用發經指頭蘸其水拭口令淨即愈

黃丹散之

一方用鹽水塗瘡即愈 地錦即 入家磚石下多有之

一方用黃柏細末付之

一方用楊木枝燒於刀上出煙付之

◎小兒牙疳 白凡 黃丹 連枝燒存性 共末付之

一方用白凡置於五倍子肉煨過末付之

◎小兒胸膈口目唇斷傷危或尿在胞中或成膈風發熱面赤

赤足金頭蜈蚣一條 鹽麥 半不 蝎梢 四 殭金 七

右末等管吹入鼻中如噴噴叫聲可治後用薄荷汁調服之

### ◎瘡疹并治例

紅曰諸痛痒瘡皆屬心火

夫小兒瘡疹之証最為酷疾不日之間死生反掌

蓋因胎毒藏於金匱過歲大太過熱毒流行於年則瘡毒因之而

發作矣一發則出於心肝脾肺四序而腎毒留邪者為毒

若初發便作腫痛見點則紫黑者多死 蓋毒氣留於腎間而不

發越故耳錢氏有百祥丸大下之法蓋治者十元一示

大瘡瘡疹之法多痒重於脾肺二經 肺主皮膚 故通身為之

班爛也 其為証 宜發越 宜紅消安眠

本宜許汗 宜紫黑微然

楊氏曰瘡疹發於肌膚陽明胃氣主之脾土一溫胃氣隨暢決元臨伏之毒

醫當察色詳証以并表裡虛實用藥

其 吐瀉不止食為裡虛 夫 皮白而陷多汗為表虛

紅活而凸錢氏多汗為表寒

又 諸痛為一實

裡實而補則結瘕毒

表實而固實表入某則癰疽不結

如 表虛者瘡易出而難愈

如 表實者瘡難出而易斂

如 裡實則出快而難

如 表實裡虛則陷伏倒靨

治之之法三日已前未見紅點必用外麻湯米蘆飲之類以發其  
表務令微汗為度若未汗表猶未解豈見紅點應投於肌  
肉間而外散開發之劑尚未可除

今醫注之不同 陳氏而行者多見其 是故和衛於熱則偏  
於寒此則升水知之道也

証 寒者熱之 又曰 微者逆之 又曰 逆者正治 多親其事也  
熱者寒之 又曰 甚者從之 又曰 從者反治

陳氏用從治之法惟 然皆不外乎冬不寒甘芍煖茶衣

劉瓛用正治之法常 芍藥茶補氣血茶為主治至亦當看時令寒者宜多施

### 丹溪治例

大小兒痘疹大抵傷寒相似發熱煩躁赤唇紅身痛頭疼乍寒  
乍熱噴嚏呵欠咳嗽痰涎

始發之時 有因傷風傷寒而得 有時氣傳傳而得 有因傷食發熱而得 有因跌撲發熱而得

為因風驚搐和凡之証 有因風驚搐和凡之証

口舌咽喉腫痛 煩躁狂躁等症

自汗 下利

發熱 不發熱

証候多端卒未易辨

必須以耳冷尻冷驗之。蓋瘡疹屬陽明，若元氣衰耳冷尻冷，便屬陰證。又不可不察其耳後有紅脈赤絲為之，直入。

前部獨冷

治法首尾俱不可妄下，但溫涼之劑，要為之。



毒發於表如多汗則榮衛愈虛，重令開泄，轉增瘡爛。由夏風邪乘間，表証者多矣。

毒根在裏如多妄下則內氣益虛，毒不外出而反令由更土不勝水，毒愈得留，身體發寒，年尾及熱咽合肚脹，其瘡黑陷十元一生汗下，二後古人深戒以此。

瘡疹証狀雖似傷寒，而其治法迥異。傷寒後表未盡，瘡疹後表已盡也。

解肌之法，宜升發，類之類可也。或氣實煩躁，熱熾大便燥結，則犀角地黃湯或紫雪丹飲多服，已利大便秘通者，少大寒尤宜仔細，斟酌不可妄用溫藥。

小便赤淡者，分利小便則熱氣有所泄而止。

凡熱不可驟退，但輕解之。若元熱則瘡又不止，發也。

凡瘡疹春風為一類  
秋冬為一類

凡瘡疹分人情陽氣形氣上取實法。

凡瘡疹但覺身熱，能似傷寒，疑似未明。



若見紅點便忌苦燥，損傷陰氣，使表虛也。

凡瘡疹初發出時，身發熱耳尻冷，呵欠噴嚏面赤，是出痘之候，宜升麻葛根湯加大力子痘必稀而易愈。

一方以辰砂一味細末看兒大小或一二分，蜜水調服。多者可分  
少者可合

一方痘熱之時，以蔥白為末，蜜調貼額門，免眼障之患。

凡痘初出之際，身熱若稠，寒者溫之，飲加茶葉煎服，減食者加麥。

凡痘初出之時，色白者，便當大補氣血，參苓白朮湯升胃汁。

丁子瀉脾白朮湯加大便泄和訶子豆蔻。

凡痘初發時，自汗不斂，蓋濕熱蒸鬱故也。甚者少以羌活散寒表。



凡痘初發時煩躁謔語狂渴引飲若飲水則後未嘗不奔急以痘未解其標

凡痘瘡已出少許化毒湯出不快者如味四聖散紫牛飲子快也

凡痘瘡發時多宜清涼茶解之酒炒本連之類之類服亦不妨庶不害服

炒灰色白淨者作茶

紫黑色者作熱

凡痘瘡

白者屬氣虛神氣為主  
黑者屬血熱涼血為主  
中黑陷而外白起相而治

凡痘瘡發分五虛用神茶

解毒蓋本連為瘡家之要茶酒炒以別破茶之性

瘡瘡用雞其毒耳無毒氣血虛寒多屬氣血不足當於不足中別其優劣以補氣血茶中分輕重當用以平為期耳

大抵治血調氣安和和中輕清消滯溫涼之劑而治此平治法

凡黑陷用元病小兒真痘存毒蜜水調服

瘡瘡者其形色脉上分虛實

實瘡以實表之劑和涼血茶

虛瘡以虛表之劑和涼血茶

氣怯輕者用淡蜜水調滑石末以匙刮瘡上調之

瘡者宜退火止用輕清之劑刮去毒并升毒之類

咽喉痛者如聖散鼠粘子湯

喘滿氣逆者麻黃芩湯

顏色正者以前平治法則安得效成

顏色不正者以前平治法則安得效成

顏色不正者以前平治法則安得效成

顏色不正者以前平治法則安得效成

顏色不正者以前平治法則安得效成

將腐時金白色如豆殼者蓋同初起時多飲水其腐不奇者四側愈  
不好宜服實表之藥及消息二便何如

如大便初宜利大便大便秘結內煩外熱者小柴胡加枳實芍藥湯  
小便秘宜利小便小便赤澀大連翹湯甘肅飲

夫瘡疹用藥固宜權度三便至不可不通之有秘結則腸胃壅滯

毒氣無從發泄者大便黃黑色其毒氣已盛不可多下五熱劑

若一秘結自閉戶咽肌肉攣黑不絕踵而裏矣

陷入者和味四聖散更以胡荽酒入身外其是噴其床帳衣被俾以涼

綿衣蓋之若未起強聖散入不香煎服

若瘡已黑乃可用宣風散加青皮

錢氏云黑陷青紫者齒牙下下不黑慎勿下余知其所下者膽

脫之邪也身熱氣促欲飲者可啗百種危惡太峻宜風散代

瀉後溫解則自不寒矣等々未香朴甘各減半為妙

其壞  
一四、內虛泄瀉  
二四、外傷風寒  
三四、虛黑脾胃

近時治瘡疹者悉宗陳本中本香散與頭煎殊不知彼立方時

運氣在寒水司天今及值歲冬大寒為回氣前過瘡疹不

得起發紅綻故用辛熱之劑裁之其宜之今人不分時令

寒熱二縣施治誤入多矣

愚按陳氏之方乃素問從治之法又從之熱自熱用者之

蓋瘡疹熱毒傳胃于脾而玉得起發故（轉）用本脾胃本朴橘

之辛散却毒之劑一二服却而聞之使毒于內者冬回氣而發

越于外故瘡子陷伏反白色者皆食然紅活凸綻而內無毒邪

切勿過劑如一二服後却而不起者亦不可多手多則反其元

爛咽閉而沈而死

近世儒醫悉引內經病機諸痛瘡瘡瘍皆為心火之語以正陳

式之失此知常而不知權之論也故後人不妄疑常用而不敢用袖手待斃哀哉

弁内外臣

凡瘡發出而未潰自發福者是外感風寒之邪而此宜懼之數或非麻葛根湯未去猶飲

凡瘡欲出而未出而吐利者是中焦傳寒或挾宿食宜  
四君子湯加砂仁陳皮或和中散和挾宿食紫雲膏

惺散

不枯細參苓甘括各三少右劉作一服活時三葉煎

木香

冬 三小 燕 桔 葛 前 陈 苓 壳 炙

木

半夏 右剉作一服和生薑煎溫服

四君子

右劉蕭溫脈如縮砂陳氏名六君子湯

和 中 書

右坐骨 服生薑煎熱服

古今

青石胆 另研 巴戟 代石 一五研

數丸食前未飲或乳汁送下

⑤ 斑痘之源

夫嬰兒之胎。所必資胎養。以長其形。緣母失節。墮。續。胎。感。其。

積毒之氣藏于膀胱

近自張提子直寒暄不常人自自

由是而發回其所受詩而為補正

痘瘡五勝歌色并見証

其原實系於空位相火之氣所爲故入於

此則成癰之類其色紅赤其形小

耳若瘡癰黑陷耳尻反折者為逆

10

見解

河女體同肝証

1

下腹乍熱腹冷多汗

也

面頰燥赤噴嚏是肝証  
腎在臍下不受肝湯熱是証

舟形氣病

瘡已出而聲不復者形病之形病身溫者宜解毒清風瘡  
瘡未出而聲復者形病之宜補肺散和生薑湯  
瘡已出而聲不復者形病之宜補肺散和生薑湯  
大便閉者宜當歸湯

形氣俱病者宜當歸湯

補肺散

膠一名牛

膠一名牛

牛房子一名牛

馬兜鈴一名牛

甘草一名牛

甘草一名牛

甘草一名牛

甘草一名牛

糯米

和生薑湯

右劉分三服煎食後時上之

解毒清風湯

一坪骨

生薑

芍藥

鼠尾

右劉煎或細末湯服

當歸湯

連一名牛

大黃

甘草

右劉分三服煎食後時上之

十冬七八

二十丸食前米飲下

加至利為度

十奇散

參

各二

朴

桂

芍

凡

主

下

右細末

滴水溫調下或劉煎亦可

舟六經証候

太陽病惡寒身熱尿赤尿出不快宜前不湯

少陽病乍寒乍熱出不快宜連翹湯

陽明病身熱自赤大便閉塞宜通風湯出不快宜升麻湯

太陰病自利脈沉宜附子理中湯木香散

少陰病自利脈沉宜附子理中湯木香散

厥陰病自利脈沉宜附子理中湯木香散

連翹湯

連翹湯

升麻湯

升麻湯

升麻湯

升麻湯

升麻湯

升麻湯

升麻湯



心主血 血不足則致 根赤不紅 宜早得湯 宜早得湯 宜早得湯

芍藥湯 芍 各二 右到水煎服

●平治之方法 以平為期 方不失一

石壁胡氏曰 凡 難往非常之熱 亦不可往 非常之冷

若熱藥太過 輕則吐利 重則臨伏倒 是宜溫涼通中可也

仁壽楊氏曰 法熱不可驟法宜輕解之

蓋瘡瘡元熱則不忌起發史成以此 種痘值天時 惟暖則易生

凡值天時不正 御障 痘瘡盛發 宜服三豆湯 油飲子

三豆湯 赤豆 大黑豆 黃豆 各一升 甘 三豆 右淘淨用水八升 煮熟 連日宜心任意食豆 飲時七日永永

油飲子 真麻油 一升 連日飲 永永不出

惺惺散 皆見前條

解毒防風湯 白芍 苓 升 葛 各七 右到煎溫服

活血散和防風湯

紅花湯 紅花 各 右以水半升 煎百沸服之

紫中湯 治瘡出不快及大便自利 紫木 苓 各二 甘 右到作一服 入糯米一百粒 煎食前服

四聖散 紫通 各二 甘 各 右到煎溫服

●凡瘡瘡出不快者 有立証

一証 天時嚴寒 為寒所折 不忌起發 宜散寒溫表 冬

正氣散 甘 各三 陳 黃 白 各半 朴 半 各一 各一 各一

右劉入姜車煎服

調解散 青陳超

人半池七

通 善 甘

紫蘇

右劉入生薑大棗煎服一方加紫中糯米

二

証 炎暑陰虛煩渴皆速出不快宜辰砂五苓散生地

夏門煎湯調服身熱甚小紫加生地煩渴便安白虎湯加寒

輕者人參湯和生地 辰砂五苓散五苓散加辰砂為末是

小紫胡湯

方宜檢他書

白虎湯

人參中紫湯

証 脈涼某損傷脾胃或胃虛吐利當溫中養氣宜理中湯吐

利甚加附

証 或厥血危一半尚是紅點此毒氣發越不遠必不巳食大

便如常者

宜

半溫東

劑用四聖散加減紫中湯亦可

四聖散

紫中湯 各在前案

一

証 外突之人皮膚厚而脹容毒氣難以發泄自出下重消

毒互透肌熱如大便秘結消毒飲內加大黃梔子煎湯

出大稠宜厚自地黃湯解毒防風湯血氣不足宜十奇散

咽嗝不利宜如聖湯加奇散口中氣熱咽痛口舌生瘡宜甘

露飲

透肌散

紫中茸 外 甘 各一不

右劉煎服

消毒飲

生房子 三不砂一 荊 一不 生甘 一不

右煎服生厚粉砂

如聖湯

結二 甘 一不 一方和生房子 各一不

右劉煎時七服

犀角地黃湯

解毒防風湯

各在前案

甘露飲

升外証逆順

身体

溫煖者項  
寒涼者逆

能食

大便

實者項  
利者逆

◎ 弁外証輕重

輕者

作三次重耳中无  
大小不一根索紅赤  
頭面赤少能滿光区

重者

一奇並出信利不  
如垂種布身溫脈脹  
灰白色頭溫足冷

◎ 弁瘡初末形証

微者

其邪在  
將發細疹狀如蚊咬所繫點赤赤色倍名題瘡

二三日始見微之欲出如黍粟或如粟豆或如水珠光明淨者佳

四日

大小不等根索紅光以者輕  
稠密陷頂併浮者重

六七日

瘡形肥紅光以者輕  
身熱氣喘口乾脈服更指冷者重

八九日

長足紅滿瘡膿色者輕  
寒數周臥脈脈煩渴氣急咬牙者重之至也

十日十一日瘡當結腐而欲落之時將愈

十二十三日當腐而不腐者為逆身熱稍熾之以防其餘身不

壯熱或脈脈或浮渴裏功散救之

◎ 弁不潔而愈

瘡脚稀跡根索紅綻不脫不渴乳食不減四肢溫和身无大熱

已上六証並不須服藥惟宜善和調護須使房室溫蓋屏

忌  
見外人  
犯房色  
聞諸穢氣

近目水婦人服臭者

宜燒大黃芙蓉不以辟急氣燒木香亦佳

勿燒沈檀降真乳香肌腐

瘡張肉宜懸胡安或以胡安噴瘡床帳

◎ 弁立不治証

痒刺寒戰咬牙渴不止 瘡紫黑色喘喘不寧 灰白色陷頂脈脈



頭暈是陰陽亂飲水

氣促泄瀉渴

○弁陰陽二証

赤疹屬陽過清涼而消

白疹屬陰過溫煖而滅

弁瘡後餘毒

一毒氣流於太陰脾經則瘡發四肢手腕膝腫肺癰宜消毒餘

外付明勝膏消毒飲方在前條

必勝膏馬齒莧 升升 猪膏脂 石蜜 右三味共熬為膏塗腫處

一毒氣流入大腸則使膿血或下腸結大便秘結宜犀角地黃湯

一瘡毒入眼宜次明散撥雲散

次明散 小次明

赤芍

天花粉 甘草

食後茶清下

撥雲散

羌活

升升

右到煎食後時服或為丸

活荷汁茶清或菊地黃煎湯調皆佳

忌鹹滋酢情淫奶炙烤氣一切發風動火之物

祖傳秘方凡瘡後不向瘡毒發於何經初起紅腫時却用黑

葉煮三豆以醋醋浸研漿時以棉細刷之瘡毒退去其勁如

大便結一小兒瘡後二旬大便不通其燥為瘡毒元用黃硝已沒及

導導俱不通惠金二餅以真麻油合口內用小竹筒一二兩投口中

吹油入腸內須臾即通真良法也

○古人治瘡要法

王氏指迷云 瘡瘡亦時氣之一端一人受正傳得其餘

又本瘡瘡有熱則易出一出通及於肌膚

張喚曰瘡子氣動則出快蓋血隨氣行氣逆則血滯

錢氏曰肝風心火二火交爭而致瘡

又曰瘡瘡形而先福大忌味辛蓋瘡屬心主血心寒則血

不流行瘡發而不可得切須慎之

大按治瘡推手肝利小便切最妙

仁齋楊氏曰

大熱當利小便宜立本散導赤散  
小熱當解毒宜消飲四聖散

② 陷伏倒靨黑陷

一証 裏膿壞爛 腎黑陷宜宣風散

一証 外感風寒所致 冬宜立攝藏 府其加指紫  
春宜不接金正氣散 加芍藥

一証 乳食所傷 內氣壅滯 宜調解散或四君子湯加縮木芍

藥大便自利理中可也

不接金正氣散 朴荳蔻 甘草 半 蒼朮 陳 各半不

右剉入生姜煮煎服

③ 痘疹膿汁不乾 蓋瘡出太盛 表虛難腐 粘衣着席 淫痛

難轉 側宜白朮散敗中散付之

白龍散黃牛黃日乾火煨成炭取心中白者為末 帛裹撲之

敗草散用蓋屋及隔背上連年 痘牛洗焙乾細末 帛裹撲之

多婦發痘 鼻胎動可之 胎動不安 胎動身熱甚 不蓋衣

糖餅或瘡稠密十奇散 婦多痔瘡 桂加香附烏莖

孕婦之節

如胎已五月則桂半之 屬俱不必禁

鼻胎散 苓 木 歸 白芍 赤芍 紫菀 人 桔 條 本

瓜 陳 荊 殼 紫 牛 膠 糯 芒 苒 芍 縮 木

加前金 各五分 右剉作一服水一盞煎至二盞 帶七午根

七寸瓜蒂一個用磁器煎透荷葉餅定熟至八分 煮粗仍用荷

葉蓋覆復空心溫服

安胎飲 大腹 湯洗焙干 人 陳 木 白芍 歸 芍 香附 各半 縮

紫菀 苓 甘 各半 右剉作一服入灯心七葉 糯米一撮煎食

前溫服

乳嬰與童非之升治

乳嬰當與治乳母經其氣血清和飲食有節後以調氣通榮

劑以釀其乳兒飽則磨心肥滿光沢无陷伏之憂

童非當備切脈審表裏虛實以行下之方至其不虛則但保其

冲和使脾氣流暢肺金藉母之助腹達和成无倒塌之憂

○麻疹初發無破土未出時宜用宜毒食表湯

外葛<sub>分</sub>麻<sub>持</sub>荷<sub>荷</sub>前<sub>荷</sub>枳<sub>通</sub>竹葉<sub>分</sub>露<sub>分</sub>

石水煎天氣大熱加荷<sub>分</sub>大寒加麻<sub>分</sub>

○麻已出而紅腫大甚宜用化毒清表湯

枳<sub>力</sub>天<sub>新</sub>蘇<sub>分</sub>前<sub>持</sub>通<sub>分</sub>連<sub>荷</sub>荷<sub>知</sub>葛<sub>荷</sub>

疹<sub>分</sub>露<sub>荷</sub>荷<sub>荷</sub>荷<sub>荷</sub>水煎口渴加愛<sub>荷</sub>黃<sub>荷</sub>大便秘

加酒炒大黃<sub>一錢</sub>

